

**ÉTUDES CLINIQUES
SUR LES
RÉTRÉCISSEMENTS
DE L'URÈTHRE, SUR
LA TAILLE ET SUR...**

Giuseppe Corradi



EUGENIO e FILIPPO CARMALI — EDITORI LIBRAII — FIRENZE

INSEGNAMENTI

di

CHIRURGIA PRATICA

Del Prof. COSIMO PALANIDESSI

Contra Chirurgo alla scuola medica di S. Paolo Roma il Principe

(TRATTATO DEGLI STUDI ANATOMICI)

SOMMARIO

Emozione immediata, considerata per specialmente nelle
angioplastiche, nelle operazioni del cavo ascellare, in
quelle della regione mammaria e nelle amputazioni
della arteria.

Controspertore e mano addestra del per
inmobilità e posizione della parte malata
Calentita; sua direzione ed estensione
Puntura.

Cura del tracciato lacrimale

Estensione dell'angolo

Operabilità del cuore.

Tachistotomia.

Emorragia e sua indicazione

Considerazioni sull'ovario

Cura dei calcoli vesicali

Integumenti esterni dell'orecchio loro trattamento

Neurosi

Cura della emorragia chirurgica

Volume in 4. — Prezzo L. 2.

Mediante vaglia postale si spedisce franco

19.9.715

SUR LES RÉTRÉCISSEMENTS DE L'URÈTHRE

DE LA TROUSSE

ET SUR LES FISTULES VAGINALES

ÉTUDES CLINIQUES



RÉTRÉCISSEMENTS DE L'URÈTHRE

FOR LATIL



SUR LES PISTOLES VAGINALES

100

JOSEPH ORRILLI

Abstract: Water is the physical basis for most life on the planet.

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is protected by copyright. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



PLATE 21

www.elsevier.com/locate/jmb

Abstract

Questo, in sostanza, è il programma di lavoro.

Tratt. Esp. Matematica (1910) n. 1

Nous sommes heureux de pouvoir publier le mémoire de M. le D^r Joseph Cornu, couronné par l'Académie Impériale de Médecine. Les travaux pleins d'originalité de ce chirurgien distingué, après avoir obtenu une récompense que l'Académie s'accorde que rarement, avaient été jugés et honorablement par la presse médicale étrangère et nationale, que nous avons insisté auprès de l'auteur pour avoir la permission d'imprimer son mémoire, il nous a semblé que nous ne devions pas laisser à des éditeurs étrangers le soin de faire connaître au public un ouvrage qui fait honneur à la chirurgie de notre pays.

CHARLES FAYARD. *Editeur*

A MONSIEUR LE PROF. CH. BURI

Monsieur,

Cher maître

*Ceci n'est pas une dédicace : car ce souvenir
a trop peu d'importance pour mériter l'honneur
de vous être dédié.*

*Permettez-moi seulement d'inscrire votre nom
sur la première de ces pages, ne serait-ce que
pour désigner publiquement la vive reconnaiss-
sance que je vous dois et rappeler la préoccupation
constante de mes travaux qui est de marcher sur
vos traces.*

*Le nom du maître est d'ailleurs la meilleure
recommandation de celui de l'élève auprès du
public : et c'est encore un service de plus dont vous
remerciez.*

Votre très-affectionné

Joseph Cornu

PRÉSENTÉ

À L'ACADEMIE IMPERIALE DE MEDICINE

PAR

PIERRE LE FRANÇOIS MONTAUDO.

RAPPORT

À L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

(sur la part d'argent de plâtre de 181-182)

Commissaires MM. Joseph Larrey, Girardin, Chaussier,
Roux, rapporteurs

Messieurs, nous avons eu le plaisir de vous présenter un concours du prix d'argent. Ce sont par ordre d'inscription :

N° 1 M. le docteur Guillou père, auteur de deux manuscrits imprimés et d'une notice manuscrite sur la *distichie pectinée*.

N° 2 M. le docteur Richard, auteur d'une notice manuscrite en quatre très-petites pages intitulée : *Traitément de la résection d'oreille, suite de paralyse de la main par la guérison de la lésion de l'oreille de l'oreille*.

N° 3. L'auteur anonyme d'un manuscrit sans titre avec la devise

*Tristis protinus ater percola
Præter est curatioque proles*

Contre-indication au traitement des résections de l'oreille et est accompagné de l'avis d'un nouvel *urthroscope*.

N° 4. M. le docteur BERNARD, auteur d'un *Traité de la lithotritie, nouvelle méthode d'exécution des calculs vésicaux*.

N° 5. M. le docteur BÉLIQUET, auteur d'un *Traité des opérations des vésicaires vésicaux*, dont le premier volume seul a paru.

N° 6. M. le docteur JOSEPH CORRELLI, de Florence, auteur d'un long mémoire intitulé *Étude clinique sur les rétrécissements de l'urètre*, accompagné des nouveaux instruments dilateurs inventés par ce chirurgien. M. Correlli présente, en outre, un rapport, un mémoire manuscrit et une brochure imprimée sur l'*opération des fistules vésico-vaginales*.

N° 7. M. le docteur JAMES SMITH, de Londres, auteur d'une brochure intitulée *Contestations de Præputium, des testicules et du prépuce*, et où l'on trouve un chapitre consacré aux maladies des vésicules.

N° 8. MM. les docteurs MALLOU et L. TRÉPOT, auteurs d'une brochure intitulée : *De la guérison durable des rétrécissements de l'urètre par la pulvérisation chimique*.

N° 9. Enfin, MM. ROBERT et COLLIN, fabricants d'instrumenta de chirurgie à Paris, auteurs d'une courte notice consacrée à la description de quatre nouveaux instruments pour l'opération de la pierre et celle de la lithotritie.

Avant de passer à l'examen de ces travaux, nous croyons devoir venir rappeler les termes du testament de M. le Marquis d'Argentan, fondateur du prix :

« Je lègue à l'Académie de médecine de Paris la somme de trente mille francs, pour être placée, avec les intérêts qu'elle produira du jour de mon décès, en « rentes sur l'État, dont le revenu annuel sera donné « tous les six ans à l'auteur du perfectionnement le plus « important apporté, pendant cet espace de temps, aux « moyens curatifs des rétrécissements du canal de l'urè- « tre. Dans le cas où aucun de ces perfectionnement, ou,

« pendant une période de six ans, soit par le fait de
« joindre n'aurait pas été l'objet d'un perfectionnement
« assez notable pour mériter le prix que l'Académie, l'Acad-
«émie des poètes l'accorde à l'auteur du perfectionnement
« le plus important apporté, durant ces six ans, au tra-
« vail de notre malade des deux années ».

« Enn, messieurs, l'Académie du traitement est formelle-
« l'Académie ne peut récompenser les travaux relatifs aux
« maladies autres que les récidivements urinaires, que
« si aucun des mémoires relatifs à ces récidivements ne
« lui semble digne de récompense ».

Nous avons dû par conséquent diviser en deux grou-
pes les travaux des concurrents. Le premier groupe com-
prend les mémoires ou interventions qui concernent le
traitement des récidivements de l'urètre.

Le second groupe comprend les mémoires ou interven-
tions qui se rapportent aux autres affections des voies
urinaires, telles que les calculs rénaux ou urétéraux,
la paralysie de la vessie, et les fistules vésico-vaginales.

Le premier groupe ne nous fournissait aucun travail
digne d'être récompensé par l'Académie, alors, mais alors
seulement, il y aurait lieu de choisir parmi les travaux
du second groupe.

Le premier groupe comprend seulement cinq ouvrages,
savoir : n° 1 (anonyme); n° 2 (M. Billaud); n° 3
(M. Goussier); n° 4 (M. Arnott) et n° 5 (M. Mallet et Trépière).

Nous avons dû comprendre dans cette énumération
l'ouvrage de M. James Arnott, puisqu'il a été accepté à
l'Académie sous une lettre de candidature au prix d'Argen-
tère. Mais dans une seconde lettre lue de la même
main et datée du même jour, l'auteur rappelle qu'il a
déjà obtenu en 1867 une partie du prix d'Argentère,
pour les observations mentionnées dans un brochure; il
ajoute dans qu'il ne vient pas solliciter une nouvelle
récompense, qu'il ne veut pas figurer au nombre des
compétiteurs, et qu'en se contentant de recevoir une lettre-

fiens à la commission, il se propose seulement de lui signaler une modification de son ordonnance; mais j'avoue sans doute comme nous, messieurs, que le droit de M. Aron doit être respecté. Il a atteint son but, qui était d'attirer de nouveau votre attention sur la possibilité d'ordonnance rétrograde qu'il a eue depuis longtemps, et la commission ne peut que constater aujourd'hui la légitimité de la récompense qu'il a obtenue et y a donc son.

L'auteur anonyme du mémoire n° 3 a inventé un instrument destiné à enlever la trace des rétroissements à la manière d'un emporte-pièce. Il ne paraît point d'ailleurs que cet instrument ait jamais été employé; non-seulement l'auteur ne cite aucune observation, mais encore il ne parle pas de succès d'expérience; il ne dit rien des phénomènes immédiats de l'opération et expose même de ses suites; de sorte que lorsqu'il termine en offrant à la commission de se mettre à sa disposition « pour faire l'expérience de son procédé », nous sommes autorisés à penser qu'il s'agit en effet d'une expérience, et même d'une possible expérience. Les trois pages du manuscrit sont, entièrement consacrées à la description très-obscure de son instrument très-compliqué. Pour faciliter l'intelligence du texte, il y a joint des figures explicatives et deux exemplaires de son instrument, mais il en résulte une nouvelle obscurité, attendu que l'instrument représenté sur les figures diffère considérablement des instruments en métal annexés au mémoire. Ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est ce passage où l'auteur décrit, comme étant de son invention, le procédé qui consiste à faire le rétroissement de l'aiguille à l'aide d'une sonde flexible de courbure, consolidée par un mandrin. Il ne suppose pas le mandrin, bien entendu, est objet, qu'il vient d'inventer n'a pas encore de nom dans son vocabulaire; il le désigne par une périphrase : « C'est une

« tige métallique de 1 millimètre de diamètre, protégée
 « par une enveloppe de caoutchouc pouvant se briser
 « sans se rompre. » Et il ajoute : « Ce mode de parvenir
 « jusqu'à la vessie est certainement très-simple, et il
 « est possible qu'il soit tout d'après longtemps, mais je
 « n'en ai point connaissance. » Cette déclaration nous
 nous permet de rendre hommage à l'ingéniosité de
 l'auteur, il n'y a pas moins de mérite à résister
 qu'à inventer, mais l'invention du mandrin n'est point
 due à celui qui pouvait prétendre au prix d'Ar-
 gentum. Quant à l'experte-pièce naso-urétrale, nous
 ne pouvons que lui souhaiter la bienvenue. Nous faisons
 des vœux pour qu'il réponde aux espérances de l'in-
 venteur, qui pourra sans doute, dans une période ulté-
 rieure, en démontrer les avantages. Nous devons com-
 pter jusqu'à un jugement qui ne reposera aujourd'hui
 que sur des suppositions.

Le volume qui porte le n° 2, et qui est l'œuvre de
 M. le docteur Roliquet, est la première partie d'un *Traité*
des opérations des voies urinaires. C'est un ouvrage élé-
 mentaire, où l'auteur décrit successivement toutes les opé-
 rations que l'on pratique sur l'urètre. Il y traite natu-
 relliement des opérations dirigées contre les rétrécisse-
 ments; c'est le sujet du chapitre IX, que nous avons
 lu attentivement; mais nous n'y avons rien trouvé de
 plus que dans les autres traités de médecine opératoire.
 Craignant d'avoir laissé passer inaperçus quelques passages
 importants et originaux, nous avons consulté l'analyse
 manuscrite déposée par l'auteur à l'appui de sa candi-
 dature; nous n'y avons trouvé que l'énumération des
 questions qu'il a successivement abordées :

« En traitant des rétrécissements, dit-il, les opérations dirigées contre
 « les rétrécissements de l'urètre, j'ai étudié la nature
 « des rétrécissements, leur physiologie pathologique, et
 « leurs propriétés physiologiques. Toutes les opérations
 « dirigées contre les rétrécissements de l'urètre, même

« la dilatation temporaire progressive, luttant contre les
« propriétés physiologiques du rétrécissement, son élas-
« ticité, sa rétractilité, sa contractilité. Mais dans leurs
« actions opposées, chacune de ces opérations intenses
« d'une force différente les lésions de la paroi de l'utérus
« au niveau du rétrécissement. Mais la dilatation locale
« a une action particulière sur les tumeurs, différente de
« celle de l'arteriosclérose. C'est la raison de l'étude
« de la physiologie pathologique des plaques des artères—
« on fait page 222.

« Enfin, se appuyant sur la physiologie, j'ai étudié et
« décrite chacune des opérations proposées contre les
« rétrécissements de l'utérus. »

Cette analyse, faite par l'auteur lui-même, montre
qu'il ne réalise pour lui-même une nouvelle et qu'il
s'efforce d'exposer dans ce chapitre l'état de la science.

Nous n'indiquons donc aucune proposition « vous ara-
mettre soigneusement au livre de M. le docteur Biquet,
si vous n'y trouvez quelque chose dans l'introduction ou passage
où l'auteur a étudié, d'une manière complète, les phé-
nomènes de l'infarction utérine, et déterminant avec
exactitude les causes de cet accident. Il distingue l'infar-
ction spontanée ou chronique de l'infarction traumatique ou aiguë. L'une et l'autre sont les conséquences
de l'absorption des matériaux de l'ovaire, lesquels, en
s'ajoutant dans la veine, s'affaissent rapidement et de-
viennent alors capables, en pénétrant dans le torrent
circulatoire, de déterminer une infarction. À l'état nor-
mal, toutefois, cet accident est rendu impossible par la
présence de l'épithélium utérin et utérin, qui oppose
un obstacle presque absolu à l'infarction et à l'absorp-
tion. Mais, lorsqu'une maladie de la muqueuse utérine
ou utérine utérine, dans une certaine mesure, la chute
de l'épithélium, l'ovaire se trouve en contact avec des
matières capables de l'absorption, et l'infarction utérine
peut survenir. D'ici les travaux de M. Simon et de notre

collègue M. Boileau ont démontré que la cystite chronique produit également la destruction de l'épithélium vésical, et qu'il faut attribuer à cette cause l'intercalation urticaire spontanée. M. Boileau, sous ce rapport, n'a fait que confirmer la doctrine de ses prédécesseurs, mais il a démontré en outre que la miction urticaire se développe quelquefois de son épithélium dans la partie antérieure au-dessous d'un rétroscrotum, jusqu'au col de la vessie, et même jusqu'à sa tige, et qu'alors des accidents d'intercalation urticaire peuvent se manifester aussi spontanément, soit à la suite du cathétérisme le plus prudent. Ceci se rattache déjà à la question des rétroscrotums urticaires, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'intercalation aiguë ou transitoire, qui survient si fréquemment à la suite de l'opération de l'uréthrotomie. Ici, l'action de l'instrument dilate généralement la sonde épithéliale, et lorsque l'urine pénètre dans la plaie, elle se trouve en contact avec une surface irritée qui se prête au cause à l'absorption. La connaissance de ce fait entraîne une conséquence pratique importante, et conduit à la prophylaxie de l'intercalation urticaire transitoire. Pour empêcher cet accident, ou du moins pour en diminuer les chances, il suffit d'introduire une sonde neuve dans la vessie immédiatement après l'uréthrotomie, et de la laisser à demeure pendant quelque temps, jusqu'à ce que la surface de la plaie uréthrale soit recouverte d'une couche de bourgeons charnus, sur laquelle l'urine puisse glisser sans nuire. Grâce à cette pratique, dont l'utilité a été démontrée par MM. Maisonneuve et Gosselin, l'opération de l'uréthrotomie a perdu une grande partie de sa gravité. M. le docteur Boileau, après en avoir constaté l'efficacité dans les cas de ces deux chirurgiens, s'en est fait le défenseur isolé et ardent. Il se peut prétendre au mérite d'avoir introduit cette notion dans la science, mais il est juste de reconnaître qu'en groupant d'une manière méthodique les faits relatifs à l'intercalation

Enfin, uncinus, en dirigeant d'une manière bien précise les deux lames qu'elle peut servir, et en en déterminant exactement les conditions, il a soigneusement contrôlé aux progrès de la thérapeutique des rétrécissements, et cette rappelle d'ailleurs qu'il a ajouté aux conséquences de ses observations, l'étude des lésions de l'épithélium aversant qu'étaient des rétrécissements. Pour ces motifs, votre commission a pensé qu'il y avait lieu d'accorder à M. le docteur Béliquet un encouragement de 1000 francs.

Le mémoire n° 3, sur le *doublement des rétrécissements de l'urètre par le galvanocautère électrique* nous a paru digne d'attention. Les auteurs, MM. les docteurs Mallin et Tignon, se sont proposé de détruire les lésions des rétrécissements en utilisant l'action dissolvante des courants électriques. Ils pensent que ce mode de destruction n'empêche pas, comme l'uréthrotomie, la reformation ordinaire, ou la rupture plus ou moins étendue qui est la conséquence de certains procédés de dilatation brusque, ou la formation d'une cicatrice rétractile, capable d'entraver la résèque. — Vous savez, messieurs, qu'un cathéter dirigé par de Breston, Hohlkloppf, la rétractile ordinaire de la méthode palme-courtois, ainsi que les rétrécissements uréthraux par la cauterisation actuelle, à l'aide d'un cathéter formé de deux tubes de caoutchouc pour une couche d'argent, et terminé par une petite auge de platine. L'instrument, tout à fait semblable par sa forme et sa dimension à un cathéter ordinaire, était porté à fond jusqu'au rétrécissement, puis on fermait le courant, et tout à coup l'axe de platine, devenu incandescent, après une coarctation instantanée. Hohlkloppf a pu ainsi guérir beaucoup de rétrécissements, même parmi ceux qui n'étaient pas amovibles aux bougies ordinaires et qui n'étaient rendus franchissables que par la cauterisation elle-même. Il pensait que cette méthode avait sur l'uréthrotomie le double avantage de ne pas exposer aux accidents d'infestation ou d'incorrection anormale,

et de confirmer la théorie. — Cette dernière opinion était probablement illusoire. Mais sur le premier point, d'accord sur la question d'innocuité, l'expérience personnelle de Middelberg a prouvé que la méthode de la cautérisation galvanique est vraiment sans gravité. La méthode que précédemment exposait lui MM. Muller et Trippel, quoique différente notablement, comme on va le voir, de celle de Middelberg, lui est assez analogue toutefois pour que l'on puisse considérer comme très-probable qu'elle ne lui cède en rien sous le rapport de l'innocuité, et de plus elle nous paraît être d'une application plus facile, parce qu'elle procède avec plus de lenteur, ou, si l'on préfère, avec moins de précipitation.

Ce n'est pas l'action électrolytique des courants galvaniques, mais leur action chimique ou électrolytique que MM. Muller et Trippel dirigent contre le tissu des rétro-déviements. C'est l'application en cas particulier des rétro-déviements adhésifs d'une méthode générale créée par Gustave Cruseil, de Saint-Petersbourg, il y a près de trente ans, et dirigée par lui sous le nom très-exact d'électrolyse étendue. Les recherches qui se firent entre des aiguilles dans la galvanopuncture, Cruseil eut le premier l'idée d'utiliser l'action chimique et descendante des électro-aiguilles vers le pôle négatif, pour opérer électrolytiquement la destruction des tumeurs. Il eut, avec des succès fort variables, l'application de cette méthode au traitement des tumeurs les plus diverses. Dans l'ouvrage (1841), il ne l'employait que pour détruire des excroissances très-petites, mais plus tard il entreprit de détruire ainsi des tumeurs assez volumineuses, telles par exemple que les cancers du sein (1846). Ces succès, auxquels on s'était accordé dans le temps que peu d'attention, furent renouvelés en 1854 par Middelberg (*De la galvanopuncture électrolytique des tumeurs par cautérisation adhésive*, lorsque M. Cruseil, en 1860, et M.

Néanmoins, en 1845, recourt de nouveau recourt à l'électrolyse dans le traitement des tumeurs.

Quelque honneur du suffrage de chirurgiens aussi éminents, l'Électrolyse ne parut pas appelée à prendre rang parmi les méthodes opératoires générales. Elle n'a en effet que fort peu d'efficacité; la sphère d'action des liquides électrolytiques vers le pôle positif est très-restreinte; les exulcères n'ont qu'une très-petite étendue, et il en résulte qu'a, pour attaquer des tumeurs de quelque volume, on est obligé d'introduire à plusieurs reprises, et sur des points différents, les aiguilles à galvanopuncture, ce qui complique et allonge beaucoup l'opération. Mais dans le cas particulier des rétrécissements de l'urètre, l'électrolyse peut toute sa portée, car il ne s'agit pas de détruire une grande épaisseur de tissu, ce qui serait très-difficile; il suffit d'en dissoudre une couche très-mince pour frayer un passage au cathéter; mais cette indication est-elle une des premières que Croquiell ait agitées. Dès 1841, dans son mémoire sur le galvanisme comme agent thérapeutique chronique (*Ueber den Galvanismus als chronische Heilmittel*, Pfortzbourg, 1841), il propose de traiter par l'Électrolyse les tumeurs et les cancers de la corée, le syphilis, le cancer, les rétrécissements de la trompe d'Eustache, et, ce qui nous intéresse surtout ici, les rétrécissements de l'urètre. Dix ans plus tard (1851), M. Worthenker fit à son tour l'essai du traitement des rétrécissements urétraux par l'Électrolyse. Mais à cette époque, le mode d'action des différents espèces de courants et la nature des piles capables de produire tel ou tel effet étaient encore trop peu connus, de sorte que ses tentatives ne furent pas couronnées de succès. MM. Müller et Trégar ont donc fait une œuvre utile en reprenant l'étude de cette méthode, qu'ils ont régularisée et perfectionnée et dont ils ont rendu l'application plus efficace.

Leur premier résultat à introduire dans l'urètre un

radiateur entouré d'un caoutchouc moulé dans toute sa longueur, à l'exception de son extrémité, on le met en communication avec le pôle négatif d'une pile à forte tension, dont le pôle positif vient s'appliquer, au moyen d'une large plaque, sur la partie supérieure et inférieure de la chaîne. On traite ainsi les vitricements fructueux; quant à ceux que le collage ne peut traverser, on les attaque d'avant ou arrière, et l'on peut quelquefois les franchir en quelques minutes, le bon du collage assurant à mesure que la destruction des fibres s'opère. La plupart des membres de notre commission ont assisté chez M. le docteur Triquet à une séance où M. le docteur Mallou a réussi à franchir en dix minutes un vitricement badier-sensibilisé composé de fibres variées. Ce vitricement, que plusieurs d'entre nous avaient exploré, et qui n'avait pu admettre aucune lumière, put recevoir, sans difficulté, immédiatement après l'opération, une bougie du calibre n° 77 de la filière oculistique.

Le rapporteur a reçu ce malade des jours après. Il n'avait plus de vécus et voyait librement.

Sans affirmer que l'électrolyse doit toujours produire un résultat immédiat avec certitude, nous pouvons dire du moins qu'elle a une efficacité suffisante pour prendre place au nombre des méthodes thérapeutiques des vitricements oculaires. Mais nous n'osons porter l'opinion ni plutôt les espérances de MM. Mallou et Triquet relativement à la question de la cécité. On se fût abstenu, à la suite de la destruction des fibres par l'électrolyse, une cicatrice privée de la propriété de rétraction qui cause la recroûte. L'expérience confirme peut-être cet espoir, mais nous ne le suivons qu'au bout de plusieurs années. Jusque-là, nous ne pourrions affirmer que les altes thérapeutiques, et il n'y a pas sans de différences entre la cicatrisation postérieure ordinaire et l'électrolyse qui, en définitive, a attaqué les fibres qu'on

il faut admettre des courbes idéales, pour que nous puissions compter sur une courbe aussi que celle qui produit le porte-ventilux adhésive. Nous ne pouvons donc pas dire encore que MM. Mallon et Trophier sont allés faire un grand progrès à la thérapie des rétrécissements artériels. Ils ne sont pas parvenus à démontrer que leur méthode est supérieure à celles qui l'ont précédée. Si, dans une période ultérieure, après une expérimentation plus longue, ils apportent les preuves que nous manquons aujourd'hui, il y aura, bien peut-être de leur découvrir le prix; mais nous nous bécotons, pour cette fois, à vous proposer de leur décerner une récompense de 2000 francs.

Le dernier travail dont nous avons à vous entretenir (n° 6), est celui de M. le docteur Cerruti, professeur suppléant de clinique chirurgicale à Florence.

Ce travail nous a fait parvenir plusieurs manuscrits sur la taille péridurale par un nouveau procédé, et sur le traitement des fistules veino-urinaires. Il est l'ouvrage d'un instrument qui permet de pratiquer d'un seul coup de bistouri l'excision de ces fistules. Mais nous ne devons nous perdre que de son influence sur les rétrécissements de l'urètre, les autres ne pouvant, cette année, prétendre au prix d'argent.

Le manuscrit de M. Cerruti n'est pas un traité complet des rétrécissements de l'urètre. Mais l'auteur cependant n'a pas voulu se borner à exposer purement et simplement son procédé; il a tenu au contraire à développer les considérations cliniques et physiologico-pathologiques sur lesquelles doit reposer la thérapeutique de ces rétrécissements. — Le premier chapitre, relatif à l'anatomie chirurgicale de l'urètre, est bien fait; l'auteur a déterminé par de nouvelles pratiques anatomiques la position, le rapport et la longueur des différentes parties de l'urètre; mais il n'a fait que continuer les faits déjà

étalées par Mûlgaard et par Paogeff. Cette partie de son travail ne renferme donc rien d'absolument nouveau.

Le second chapitre, relatif à la physiologie pathologique des rétrécissements, est celui qui contient toute la doctrine de l'auteur, les bases principalement sur l'observation clinique, et aussi, d'une manière secondaire il est vrai, sur l'anatomie pathologique, il distingue jusqu'à cinq espèces de rétrécissements, qu'il soumet à une thérapeutique spéciale. Ce sont : 1° le rétrécissement nodulaire, ou par fucus de nature, consécutif aux plaies ou aux déchirures de l'urètre, ou à des contusions violentes ; 2° le rétrécissement par lésion phlogistique, consécutif à un travail inflammatoire dont la hémorrhagie est la cause la plus ordinaire. Ce rétrécissement survient pendant la durée même de la hémorrhagie, ou peu de temps après, il est assez rare ; 3° le rétrécissement squameux ; 4° le rétrécissement atrophique dont le siège ordinaire est la portion spongieuse et bulbeuse de l'urètre, et qui survient le plus souvent sans cause connue, chez des individus qui peuvent n'avoir eu aucune hémorrhagie ; 5° enfin le rétrécissement par atrophie, qui se différencie du précédent que par un seul caractère : l'induration ou état scléreux de la substance spongieuse de l'urètre, dont le fucus nodulaire est en même temps atrophique.

Cette classification est peut-être trop compliquée ; il ne nous semble tellement démontré que les deux dernières espèces soient autre chose que deux degrés d'un même processus pathologique. La distinction établie entre elles par M. Cornali nous a paru reposer sur l'observation clinique plutôt que sur l'examen anatomique. L'atrophie est sclérotique ou simple suivant qu'elle oppose plus ou moins de résistance à la dilatation, mais ces deux formes sont reliées par des degrés intermédiaires qui rendent arbitraire la ligne de démarcation. D'une manière générale, nous remarquons que M. Cornali

tant trop peu de cas de l'anémie pathologique, il est bien sûr que, dans le cas particulier des anémies anémiques, l'anémie pathologique n'a pas encore donné de résultats complets et satisfaisants; on n'est pourtant pas sans raison pour penser au principe général, comme il l'a fait, la subdivision de cette anémie à la clinique. Mais nous devons reconnaître avec l'auteur que les troubles fonctionnels, qui accompagnent les anémies, sont loin d'être toujours proportionnels à l'intensité de la lésion. Il y a là, dans la physiologie pathologique, une lacune qu'il sera raisonnable de signaler. Par exemple, faisant allusion aux belles recherches de M. Alphonse Gustin sur les urinaires des sujets atteints de l'amyphalémie de Clamart, il s'est demandé si les mêmes lésions par notre collègue comme constituant le premier degré des néphroses chroniques (travaux récents de l'auteur à l'École de médecine de Paris), et la réponse a pu se faire douteuse pour lui, puisque les sujets n'avaient pas été observés pendant leur vie. D'un autre côté, lorsque un malade atteint de néphrosisme vient à mourir après avoir été observé par un médecin, il est bien rare qu'il n'ait pas été noté pendant sa vie l'existence d'une ou de plusieurs complications de la lésion du rein, de sorte que l'auteur trouve presque toujours quelque chose à décrire. On croirait donc que M. le docteur Cornu ait été conduit, dans de ses engagements scientifiques, à faire reposer principalement sur l'observation clinique la classification des néphroses de l'urètre. Il y a néanmoins un fait anatomique que ses prédispositions, notamment M. Alphonse Gustin, avaient déjà signalé, et que ses propres observations ont pleinement confirmé : c'est que le tissu rénal, dit-il par lui-même contre la forme anatomique connue à tous les néphroses chroniques, n'est pas que dans les cas très-rare où le néphrosisme est produit par une cause traumatique.

C'est là le fait essentiel qui domine toute la pratique de M. Cerny. L'uréthrotomie, suivant lui, doit être réservée exclusivement pour les cas de rétrécissements malades, c'est-à-dire traumatiques. Il la rejette dans tous les autres cas; il rejette également toutes les autres opérations violentes, et il pense que la méthode de la dilatation, également étonnante, depuis quelque temps, par beaucoup de chirurgiens même des rôles de Rejhard, doit reprendre toute sa prééminence.

Il reconnaît toutefois que la dilatation progressive avec des bougies proscrite, au début du traitement, est une lenteur capable de décourager les malades et de laisser les chirurgiens, du côté en effet que les bougies fines, par lesquelles on est presque toujours obligé de commencer, ont une telle souplesse, qu'elles pénètrent au moindre obstacle; elles ne peuvent donc enlever qu'une action dilatatrice très-faible; c'est seulement lorsqu'on arrive à passer des bougies des n^{os} 11 et 12 que la dilatation marche rapidement, mais jusqu-là on peut perdre beaucoup de temps, et cette lenteur extrême, qui peut faire durer le traitement plusieurs mois, est certainement l'un des motifs qui ont conduit beaucoup de chirurgiens à donner la préférence à la méthode plus grave, mais beaucoup plus prompte, de l'uréthrotomie.

Supprimer la longue période du début du traitement par la dilatation, tel est le but que s'est proposé M. le docteur Cerny. Partant de cette notion que les rétrécissements non malades ne seraient opposer une grande résistance, il a imaginé un instrument destiné à poursuivre instantanément la dilatation des rétrécissements jusqu'à un degré d'amplitude qui permet l'introduction des bougies des n^{os} 11 et 12. Cette valeur de dilatation doit être différente de celle qu'a dû avoir jusqu'ici par ce caractère important qu'elle n'entraîne jamais les lésions de l'élasticité de la muqueuse et du tressu propre de l'urètre, qu'elle ne divise pas les fibres, qu'elle ne les

(Gouze)

1

fait pas de mal, qu'elle n'y produit ni hémorrhage ni inflammation, qu'elle ne provoque aucune autre douleur.

L'instrument de M. Corneli consiste en une tige droite métallique et fine, composée de deux fils d'argent parallèles unis par soudure à leur extrémité vicinale, et libres dans le reste de leur étendue. L'un des fils, plus fin que l'autre, peut être raccourci à l'aide d'un point métallique adapté au périllon extérieur. Lorsque ce fil se raccourcit, l'autre se relève de lui comme un arc de sa corde. Lorsque on relâche le fil fin, l'arc se redresse en se confondant avec sa corde, et l'instrument rectiligne, très flexible, n'a plus que 1 millimètre de diamètre. On l'introduit sans jusqu'en défil du rétrécissement, puis on l'ouvre et on le retire lentement, on éproue une dilatation transitoire, à peine douloureuse, qui ne fait pas couler une goutte de sang, et immédiatement après on introduit sans difficulté une bougie du calibre n° 12. Les jours suivants, on augmente rapidement le volume de la bougie, et il suffit en général de six ou de quinze jours, quelquefois il suffit d'une seule session, pour arriver au terme de la dilatation.

M. Corneli ne prétend pas que son procédé soit supérieur, sous le rapport de la récidive, à la dilaton urétrale. Il pense qu'aucun procédé ne met à l'abri de la récidive, et ne dispense les malades de la nécessité d'introduire de loin en loin une sonde dans l'urèthre. Cet aspect de la récidive, invoqué contre la dilatation, on peut l'invoquer aussi bien contre les autres méthodes, et dès lors la dilatation reprend l'avantage qui résulte de son innocuité, elle le reprend surtout grâce à l'innovation heureuse qui permet de supprimer la longue période du défil et d'abréger les soins du traitement.

Cette rapide analyse vous montre, messieurs, que le mémoire manuscrit de M. Corneli est un travail important dont tous les éléments s'enchaînent d'une manière logi-

que nous croyons devoir vous signaler les qualités scientifiques de l'auteur, qui ne s'est pas borné à vous offrir une brochure ou un instrument, et qui a tenu à vous soumettre un mémoire digne d'être présenté à nos Académies. Par ces qualités, l'auteur s'élève déjà au-dessus de ses contemporains; mais ce qui nous a frappé surtout, ce sont les efforts utiles qu'il a faits pour mener la thérapeutique des rétrécissements de l'urètre dans une voie de prudence que beaucoup de chirurgiens ont abandonnée.

À plusieurs reprises déjà, il s'est produit dans la chirurgie une réaction plus ou moins durable contre la vieille méthode de la dilatation progressive. Comme elle ne répondait pas à toutes les aspirations, qu'elle était lente dans ses actions et qu'elle causait souvent la récurrence ou produisait, il était naturel que l'on cherchât des méthodes plus promptes et d'un effet plus durable. C'est ainsi qu'on a vu s'élever successivement contre elle les partisans de la caustérisation, de l'excision, de l'uréthrotomie interne, de l'uréthrotomie externe avec ou sans conducteur, de la galvanocautérie, de l'électrolyse, etc. Si nous en plaignons peu, et ces nombreuses méthodes n'ont pas toujours répondu à l'attente de leurs auteurs, elles ont du moins servi la pratique de recherches nouvelles, qui toutes peuvent trouver d'utiles applications dans certains cas particuliers.

Parmi ces méthodes, celle qui a obtenu le plus de succès, c'est l'uréthrotomie interne, et l'acoulin a singulièrement contribué à ce succès en devenant, il y a dix-huit ans, le prix d'Angotienail au maître de Baynaud. Le motif qui donna ses communications à couronner ce travail, ce ne fut ni la nouveauté de la méthode, car l'uréthrotomie avait été pratiquée avant Baynaud, ni le mérite de l'invention instrumentale, car sans ce rapport l'instrument de Baynaud ne pourrait être cité comme un modèle de perfection; ce furent des considérations d'un

order plus élevé qui finit par passer la balance à l'extrémisme, d'avoir été jusqu'ici qu'une opération purement empirique, qu'un moyen rapide d'arriver passagèrement aux grandes saines. Bayard, pour la première fois, lui donna la caractéristique d'une opération basée sur des indications bien déterminées. C'était l'époque où Garde, généralisant les idées de Delpsch sur la rétraction du fœtus insoluble, venait de démontrer que les tumeurs allongées, soulevées à l'incision abdominale, se comportent et se rétractent comme de véritables modules. De cette doctrine, Bayard avait cru pouvoir déduire toute la théorie des rétrécissements métriques. Les pièces relatives à cette affection, même même aujourd'hui dans les manuels, indiquent alors leur plus rare cause. Cette pensée s'explique aisément si l'on songe que les rétrécissements métriques déterminent souvent la mort; les maladies qui s'accompagnent de rétrécissements ne compliquent d'accidents métriques, de suppurations de fœtus, toutes des conditions capables d'annuler complètement la formation d'un faux module. On comprend sans comment Bayard, agissant d'abord principalement comme exceptionnelle, a pu prendre les complications pour la lésion essentielle, et comment il a dû conclure à attribuer la production de tous les rétrécissements au spasme de l'utérus à la formation et à la rétraction d'un fœtus insoluble, qui n'existe en réalité que dans les cas de rétrécissement traumatique. Or, tout le monde connaît les propriétés du fœtus insoluble en général, on sait que s'il peut sécher pour un temps à l'air ou à la distension, il reprend presque toujours, dès qu'on l'abandonne à lui-même, sa propriété de rétraction. De cette action découlent tout naturellement l'indication d'inciser le fœtus rétractile, et de l'inciser dans toute son épaisseur; et de la sorte la méthode de l'extrémisme interne peut passer comme sur la base solide de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. Il faut bien le dire, la preuve que l'on connaissait

alors sur l'anatomie pathologique des rétrécissements valvulaires rendait confondre pleinement la doctrine de Bayle avec celle de Lillius. Etait parfaitement vraie pour ce qui concerne les rétrécissements traumatiques. En l'appliquant par extension aux autres espèces de rétrécissements, Bayle avait donc pour lui de grandes probabilités, et l'Académie, en encourageant ses recherches, rendit un jugement pleinement conforme à l'état des connaissances acquises à cette époque.

Mais depuis lors deux ordres de faits sont venus changer la face de la question. D'une part, l'uréthrotomie, pratiquée régulièrement dans la poitrine, a été exécutée un très-grand nombre de fois; elle est devenue, pour beaucoup de chirurgiens, une méthode presque exclusive. On a pu ainsi en apprécier la gravité, et l'on a pu constater surtout qu'elle ne met nullement à l'abri de la récidive.

D'une autre part, les recherches anatomopathologiques, parmi lesquelles celles de M. Alph. Guérin doivent être mises en première ligne, ont prouvé que la tumeur inéluctable d'écarts, comme ilément prouvé, que dans les cas de rétrécissements traumatiques, c'est-à-dire dans des cas exceptionnels.

Les considérations théoriques qui servaient pour établir la supériorité de cette opération ont donc perdu toute leur valeur, au même temps que les raisons qu'elle avait fait connaître étaient épuisées. Elle doit conserver une place importante dans la chirurgie, puisqu'elle remplit elle seule la véritable indication thérapeutique dans des cas d'un ordre déterminé; mais elle ne peut plus prétendre à devenir la méthode générale du traitement des rétrécissements valvulaires, et elle doit céder le pas à la seule méthode de la dilatation qu'elle a eu l'audace de remplacer, et qu'elle avait supplantée effectivement dans l'esprit de beaucoup de chirurgiens. C'est dans cette pensée que vos commissaires ont accordé une attention

toute particulière aux recherches de M le docteur Corradi, dont l'ingénieur possédait, en abrégeant considérablement le durée du traitement par la diète, les deux diètes la principale objection que l'on pourrait diriger contre cette méthode. On est persuadé que l'attention de cet honorable confrère constituait un progrès réel, et (sans appeler à exercer une influence quelconque sur le porteur) Ce serait peut-être en exagérer l'importance que de décerner à l'auteur le prix d'Argentati tout entier, mais nous vous proposons de lui décerner une récompense de 5000 francs.

Nous venons, messieurs, de passer en revue le premier groupe des mémoires adressés à l'Académie pour la concurrence du prix d'Argentati celui qui se rapporte au traitement des rétrécissements valvulaires. Parmi ces mémoires, trois nous ont paru dignes de participer à la récompense que vous êtes appelés à décerner.

Premiers, aux termes mêmes du testament du marquis d'Argentati, la récompense ne peut plus être accordée aux travaux qui contiennent entre autres groupes, et qui se rapportent aux autres maladies des organes génito-urinaires, et vous jugerez sans doute comme nous qu'il serait superflu de nous en présenter l'analyse.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer de décerner :

1° Une récompense de 5000 francs à M le docteur Corradi, professeur suppléant de chirurgie à Florence auteur du mémoire n° 6.

2° Une récompense de 2000 francs à MM les docteurs Kellen et Trippe, auteurs du mémoire n° 8.

3° Un encouragement de 1000 francs à M le docteur Reliquet, auteur de l'ouvrage qui porte le n° 4.

AU LECTEUR

J'ai beaucoup hésité avant de permettre la publication de ce mémoire ; car je suis le premier à reconnaître qu'il manque des qualités requises pour qu'un ouvrage soit admis aux honneurs de l'impression. Ce travail a été fait dans une autre intention, et le résultat, je dois le dire, a dépassé toutes mes espérances. Quoiqu'il en soit, j'ai dû céder aux nombreuses demandes qui m'ont été adressées, aux prières de mes amis, et aux sollicitations de M^{rs} Carmello, frères, éditeurs, que je suis heureux de remercier ici publiquement du rôle et de l'intérêt qu'ils m'ont montré.

Puisque je me suis décidé à publier mon mémoire couronné par l'Académie Impériale de Médecine, je veux avec empressement cette occasion pour exprimer mes sentiments de vive reconnaissance envers les membres de la Commission qui ont bien voulu m'accorder cette haute distinction honorifique.

La Commission a dit dans son rapport qu'elle se limitait à porter un jugement sur le quantum des mérites mérités de l'auteur ; ce qui est d'autant plus flatteur pour moi, puisqu'en s'en tenant à la volonté du destinataire, le Marquis d'Argenson, elle a accepté que cette partie de mon travail méritât à elle seule une récompense si honorable pour moi. Sans doute mon corps de thèse, qui se compose d'un chapitre sur les distri-

les vésicules-vaginales, d'un coup sur la taille, etc., n'a pas eu besoin de discuter pour le gain de la bataille. Je n'en suis pas moins convaincu que le travail sur les testicules sera également bien accueilli, car ma méthode opératoire m'a donné les résultats les plus heureux. Ces jours derniers j'ai encore opéré une dame qui depuis 25 ans avait une fistule vésico-vulvo-vaginale (Jobert). La fistule était ancienne après un avortement des plus laborieux qui avait nécessité l'application du forceps lésé par le Prof. Regnoli. Le fœtus était mort et présentait les signes d'une putréfaction avancée. Le vagin était dans toute sa longueur très-rétréci, cailloteux, excorié; les masses sautes de la fistule dures et rondes sur quelques points presque cartilagineux par les caustiquisations répétées et la lésion due de la maladie. Cette dame avait été à diverses époques traitée par un sang des chirurgiens les plus distingués de Florence; il suffit de rappeler les Prof. Manzoni, Regnoli, Biondi et Zanotti. Je pratiquai l'opération qui, y compris deux longs repos accordés à l'opérée, dura environ une demi-heure. Sans le moindre anesthésique la malade n'a pas même éprouvé la moindre douleur de tête; j'enlevai au distique pour une partie des points de suture, les autres au quaternisme, et le soir même, après avoir enlevé la sonde, la vessie fonctionnait librement. La plaie de la fistule est maintenant comblée par une caustique arsenicale et complète. (Voir l'inséparable A. E. n° II. 1^{re} juin 1876)

J'appelle donc l'attention du public médical sur mon corps de réserve qui n'a point été engagé dans la bataille. Quant au corps de bataille qui veut se essayer le feu, il a subi quelques pertes, comme il fallait s'y attendre, et je profite de cette occasion pour en changer les files un peu colatées. Il me semble cependant que quelques attaques ne sont pas tout-à-fait de haute guerre, et je demande la permission d'y répondre.

Il est dit dans le Rapport que le chapitre sur l'ana-

comme « en confirmant rien d'absolument nouveau », des
souffrant la glaise de Malgouyres « prit une nouvelle forme
sur toutes les questions soulevées par la chirurgie ma-
joritaire; je le reconnais sans peine, comme je suis fort
bien qu'il ne s'agit pas, en fait d'anatomie topographique,
de discuter un nouveau cas ou quelques autres organes;
mais, si je ne me suis pas suffisamment illustré, je crois
avoir été le premier à établir les rapports des parties
profondes du péricrâne avec la ligne occipito-pariétale, et
je pense que mes préparations m'ont donné des résul-
tats sur les rapports anatomico-topographiques « discor-
dables de ceux obtenus par les autres institutions qu'ils
peuvent présenter aux chirurgiens de nouvelles données
anatomiques ».

Le Rapport contenant ailleurs ces mots : « D'une ma-
nière générale, nous remarquons que M. Carnot s'est
trop peu de cas de l'anatomie pathologique; il est bien
vrai que, dans le cas particulier des rétrécissements
artériels, l'anatomie pathologique n'a pas encore
donné de résultats complets et satisfaisants, ce n'étant
peut-être pas une raison pour établir un principe gé-
néral comme il l'a fait, la subordination de cette science
à la chimie. Mais nous devons reconnaître avec l'auteur
que les troubles fonctionnels, qui accompagnent les ré-
trécissements sont loin d'être toujours proportionnels
à l'étendue de la lésion, » Et d'abord on me fait le tort
de croire que l'étude particulière d'un seul sujet puisse
me diriger mes conclusions, mes opinions, mes principes
scientifiques. La pathologie générale, que je professe,
quelle qu'elle soit la valeur, est évidemment et domine
toute la pathologie spéciale ainsi que la pratique. En-
suite ce n'est pas la première fois que j'exprime mon
opinion sur l'anatomie pathologique. Le malade me le
prie dans la clinique, accompagné de la physiologie, de
la chimie, de l'anatomie normale, pathologique, micro-
scopique, etc. Il tâche à l'aide de ces moyens d'inter-

prêter de son nom à un grand livre de la nature, la maladie. Il est évident que le médecin étudie le malade d'une façon qui lui est toute particulière, en tenant compte de tous les attributs de la maladie. Cela ne veut point dire que l'on négligeonne sans l'anatomie ou la physiologie à la clinique ou réciproquement celle-ci à celle-là. Quant aux classifications on ne doit jamais oublier que ce ne sont que des outils de l'esprit humain pour faciliter l'étude et l'exposition de certains sujets complexes, et simplement pour aider la mémoire. C'est tout ce qu'on peut leur demander; et puisque les classifications n'ont qu'un intérêt très-secondaire dans la science, il est naturel que le chimiste ait sa classification, que l'anatomiste et le physiologiste en aient une autre qui leur est propre, et que le clinicien ait aussi la sienne; car, quelque droite que soit l'efficacité que cela ait eût-elle les uns sur autres, il n'en est pas moins vrai qu'elles diffèrent entre elles. Il en est et il en sera toujours ainsi tant que la médecine devra procéder par la méthode d'analyse, si tantefois on veut jamais le jour où la synthèse scientifique de toutes les connaissances sera possible pour constituer une seule science dans le sujet sera l'homme. Je laisse donc place et entière liberté à l'anatomiste, au physiologiste, au chimiste de se faire leur propre classification, non j'entends et je prétends que le clinicien ait aussi la sienne. L'anatomie pathologique recueille la centaine des attributs les plus sensibles, les plus constants des maladies; naturellement ces attributs sont de la plus haute importance pour faire une classification, mais de ne représentant pas à eux seuls l'ensemble de tous les attributs, et pourtant la classification anatomique ne peut entièrement satisfaire le clinicien. Dans longtemps que nous voudrions élaborer un ordre de nomenclature à trois séries, une science à une autre, nos écoles qui doivent toujours la chaire fièvre des systèmes, qui ne

servent qu'à cacher la vérité. En médecine le système est l'ennemi du vrai, peu importe qu'il soit le produit de la philosophie (comme furent les systèmes des médecins); de la métaphysique et de la chimie (astro-métaphysique, astro-chimie), ou si l'on veut de la physiologie et de l'anatomie. Le médecin, obligé d'étudier le malade sous le triple aspect de l'étiologie, de la symptomatologie et de la thérapeutique, classe les maladies suivant ces trois ordres d'attributs. Ce sont là les réseaux qui se sont conduits à établir au point de vue clinique cinq espèces de réclassifications, sans trop s'inquiéter si le flux anatomique venait pleinement confirmer une classification.

Le concubinaire de l'Académie impériale de Médecine n'a pas trouvé qu'au point de vue anatomique on puisse distinguer les réclassifications etrologiques de ceux dont j'ai formé le cinquième groupe, et qui réunissent l'astrologie à la médecine, parce que, n'a-t-il été dit, on ne peut tracer une ligne précise de démarcation. Mais c'est ce qu'on peut dire de toutes les classifications, précisément parceque les classifications sont de simples artifices et non des réalités. Combien n'est-il pas difficile de tracer une limite exacte entre les étres intermédiaires et organiques? Combien n'a-t-on pas discuté sur les limites exactes entre le règne minéral, le végétal et l'animal? Le temps, en se déroulant en années, est-il resté dans des limites naturelles? Où est la limite exacte entre le raisin et le foin? Et comment pouvons-nous avoir la prétention de tracer ces limites exactes entre les diverses maladies et surtout entre maladies qui affectent le même organe et, ce qui est encore plus difficile, entre maladies qui ont en commun une certaine catégorie de symptômes? Voyez plutôt si dans les fièvres les plus effluentes, là où d'un côté l'astrologisme existe et de l'autre la médecine très-marquée, il n'y a pas une grande différence entre eux deux, non seulement au point de vue clinique,

mais encore au point de vue anatomique; regrouper alors si cette classification est entièrement saine ou si elle présente quelque avantage pour l'exposant plus facile de la matière (hors de toute classification). La question résout-elle dans ces termes: faut-il conserver la cinquième classe de rétrécissements? Je veux que oui.

Ces observations, que je fais sur le rapport de la Commission, sont bien d'être inspirées par le membre correspondant; mais je dois les faire pour donner une explication plus exacte de mes pensées, que probablement j'ai exposées dans mon travail avec trop de brièveté et pas assez de clarté. — B'ailleurs le membre pleure de courtoisie et l'intérêt avec lesquels cette Illustre Commission a parlé de mon mémoire remplissent mon cœur de la plus vive reconnaissance; j'ai encore été bien agréablement surpris, en voyant avec quelle parfaite concorde les membres de cette Illustre Commission ont voté l'opini dont j'ai été animé en formant ma thèse et qui consiste à maintenir par toutes les preuves possibles la méthode de la dilatacion, et à combattre sans cesse l'authenticité connue méthode générale. La Commission à laquelle je renouvelle mes remerciements et l'expression de mon profond respect, me permet-elle-elle encore une dernière observation sur mon rapport? Pour rendre court et même très-court la première période de traitement des rétrécissements (Jusqu'à n° 10 ou 15), je me sers non seulement de mon dilatateur à ressort, mais encore de mes algues métalliques et du dilatateur en chapelier. Ce dernier instrument polémoie sur tous les autres connus jusqu'à ce jour l'avantage certain: si l'on relâche le fil, s'est une longue maille à sa pointe connue de la cire; si on le tend, les grains, se pressent les uns sur les autres et constituent une longue poutre indéformable. Le chirurgien a donc entre les mains un instrument qui peut devenir

à volonté et dans les divers moments de l'explication une longue note comme la dire ou l'inscrire.

Je dois, avant de terminer ces quelques mots préliminaires le dire que j'ai textuellement reproduit dans cet ouvrage le travail sur les rétroissements, parce qu'il m'a eu l'honneur d'être approuvé par la Commission. Quant aux autres parties du mémoire que la Commission a laissées de côté, j'ai pris la liberté d'y faire quelques retouches; puisque ces chapitres n'ont pas été jugés par l'Académie et qu'il s'agit non pour la première fois sous les yeux du public, j'ai cru pouvoir leur donner un dernier coup de pinceau afin qu'ils fussent plus présentables. C'est surtout à l'appareil instrumental que j'ai fait quelques modifications et je me suis attaché à décrire avec plus de précision certains instruments.

J'ai voulu aussi profiter de l'impression de ce livre pour offrir au public médical la description d'un nouvel instrument que j'ai imaginé en passant d'abord. Il m'a semblé plus convenable de le décrire ici que d'en faire le sujet d'un article de journal, de n'en pas rendre non plus en retarder la communication au public jusqu'à la publication d'un autre travail que je prépare, parce que nombre de personnes le connaissent déjà, et je courrais le risque de le voir présenter avec quelques légères modifications sous le nom d'un autre inventeur. Je veux parler d'un nouveau cathéter pour l'opérateur de la vessie.

Florence, 16 Juin 1879.

ALBERT COHEN

AVANT-PROPOS

C'est au lit du malade que nous devons trouver la sanction de nos opinions théoriques, celles qui ne peuvent supporter l'épreuve de l'observation clinique, doivent être ou corrigées ou mises de côté. Chargé d'enseigner, depuis nombre d'années, la médecine opératoire, je me suis appliqué avec une sorte de prédilection à étudier les affections des voies urinaires, et je crois que mes recherches sur les rétrécissements de l'urètre et sur d'autres points ne manquent pas d'une certaine originalité. J'ai soumis mes idées au conseil de la pratique qui est venue les confirmer au delà de mes espérances. Après que tout l'enseignement clinique et théorique de la Chirurgie m'eût été confié pour un temps, j'eus l'opportunité de donner au public, en présence des élèves, la démonstration de mes vues sur la pathologie des rétrécissements, de mes instruments et de mon procédé opératoire pour les guérir. Il ne me restait plus qu'à les publier pour en donner connaissance au public. Mais il n'est pas rare de trouver dans l'histoire de notre art des exemples d'opérations qui, tout en ayant donné les plus heureux résultats, n'ont pourtant obtenu le droit de cité dans la science

qu'après être restée dans la pratique de chirurgiens illustres, elle a mérité l'approbation de quelque corps scientifique d'une grande autorité. Assurément ni mon nom ni ma pratique personnelle n'avaient assez d'autorité pour recommander au public médical mes opinions, mes instruments, ma manière d'opier; j'attendais l'occasion de pouvoir les soumettre au jugement d'une illustre Académie. Pourrai-je en trouver une plus propice que dans la circonstance actuelle et les illustrations de la chirurgie française se réunissent au tribunal suprême pour juger et récompenser les progrès qu'ont fait depuis dix ans la science et l'art sur les maladies des voies urinaires? Si mes opinions, mes instruments, mon procédé opératoire obtiennent un accueil favorable de la part de cet auguste tribunal, pourrai-je hésiter encore à publier et à présenter au public médical mon traité sur les retentissements de l'urètre? Lors de ma l'obtention de l'ingénieur la Commission pour le prix d'Argenson par la lecture d'un long traité sur la matière; ce manuscrit que je lui présente, n'est que le résumé contenant la partie originale de mes propres études, dépendant de tous les sujets d'érudition qui naturellement doivent se trouver dans tout traité moderne. C'est ainsi que j'ai cru devoir tenir la plus grande réserve dans le catalogue des opinions d'autrui, puisque mes paroles s'adressent principalement à ceux qui sont chargés de cette mission. Je dois encore avouer que c'est pour moi une grande difficulté d'être obligé d'écrire dans une langue étrangère; et j'ose espérer que mes juges voudront bien tenir compte de l'obscurité que peut jeter sur ma pensée un langage déficient et dénué de propriété.

Ce travail se présentant dépourvu de tout appareil scientifique, manque d'unité et de proportions; mais je suis persuadé que la Commission me saura gré d'avoir réuni en peu de pages tout ce qui dans mon traité m'est personnel et peut par conséquent être sujet à la critique. Au lieu de m'étendre longuement sur la question des rétrécissements de l'urètre, au lieu de résumer des choses répétées cent fois, j'ai pensé qu'il valait mieux appeler l'attention bienveillante de la Commission sur d'autres points de mon Traité sur les affections des voies urinaires parce que je dois avoir son opinion sur cette autre partie de mes études.

Je parlerai de mon procédé opératoire pour la guérison des fistules vésico-vaginales.

J'ajouterais, en forme d'appendice à la note sur les fistules, un procédé pour la taille chez la femme.

Je ferais enfin également comme appendice à la partie qui traite des rétrécissements un procédé qui m'appartient pour l'extraction des grosses pierres de la vessie chez l'homme.

La clinique m'a été favorable; et le jugement sans appel de cette illustre Académie m'est aussi encourageant, j'aurai certes pour moi l'opinion publique.

CONSIDÉRATIONS

Sur l'anatomie topographique de l'urètre, de la vessie
et des organes adjacents.

Dans les deux enseignements, clinique et théorique, j'ai constamment pris pour point de départ l'anatomie de l'urètre qui, même à l'état normal, présente des rétrécissements; je l'ai fait suivre de la description des instruments et des règles que l'on doit observer pour franchir ces obstacles physiologiques. Ces notions préliminaires m'ont conduit à parler des rétrécissements congénitaux et des moyens les plus propres à leur guérison. Je n'ai pas l'intention de faire dans ce paragraphe une description détaillée et complète de la région où sont situés ces organes. Toutant, comme les études spéciales que j'ai faites de leur anatomie m'ont donné des résultats topographiques qui s'éloignent en partie de ceux que l'on peut lire dans les traités classiques même les plus récents. Je ne crois s'aggraver de les exposer ici, sans faire de description exacte de la région, d'autant plus qu'il est de la plus haute importance de bien fixer les données anatomiques nécessaires à mon sujet et qui lui servent de fondement. Les différences que l'on remarque dans une description et qui portent plus particulièrement sur la situation, les dimensions, les rétrécissements, et les dilatations normales de l'urètre, sont le résultat de nombreuses

expériences sur la cadence et des données fournies par l'exploration de l'écriture au lit du malade (1).

Je suppose l'homme debout, et en commençant la description par les parties profondes, j'établis comme limite inférieure la plus profonde. Ensuite la

Pour vous donner j'ai écrit les deux expériences sur le cadence. Je les ai écrites sur le type inférieure partant de la région hypogastrique, se prolongeant sur le squelette jusqu'à l'abdomen du patient, en indiquant le squelette sous-jacent, représentant l'arcade à partir de l'abdomen du corps, se prolongeant en haut, indiquant les squelettes épigastriques du corps jusqu'à l'arcade dorsale vertébrale. Sur la fin ligne, en avant de petites notes et de la note à droite, je donne le cadence et le poids. En regardant plus profondément l'écriture hypogastrique, je mets à droite et à gauche, j'y indique une petite note, une note qui me sert à y donner une légende au cadence. Le cadence est noté dans la position vertébrale, le corps dans une direction déterminée, et j'ajoute une légende de l'écriture sur la partie à gauche, et une légende sur la droite et le cadence. Dans le grand nombre d'expériences que j'ai notées, je me suis servi de deux notes seulement. Je place une note à droite et à gauche, la note, le cadence, le squelette, etc. etc. dans les mêmes positions. Mais que le squelette inférieure soit noté par l'écriture, je note la partie, je place entre un peu l'écriture après que je trace le cadence, après le temps nécessaire pour tracer le squelette et l'écriture. Je complète par la fin le cadence de la ligne inférieure en notant les parties notées, tout en plaçant dans des notes des notes des notes indiquant etc. de cadence les notes et les notes dans les notes et en notant les notes notées. Une note transversale non-vertébrale entre les deux extrémités hypogastriques et dorsales de la grande section est la ligne inférieure. Le cadence du corps avec le cadence correspondant est noté, et tout les notes latérales sont notées en place de la partie d'écriture en quelques notes, j'ai pu facilement noter les notes entre les notes avec la plus grande précision, en sorte que j'ai pu me facilement donner à tout les notes dans les notes les notes avec précision. Il est en haut le cadence, j'ajoute sur la partie de la partie inférieure, et j'y trace les notes, les notes principales, et de tout je indique la cadence. Tel est le procédé que j'ai suivi dans le cadre de mes recherches anatomiques. Quand les notes de cadence les cadences et d'écriture par les notes dans les notes

verge et le sommet le plus péruvien (palle-péruviano) a la forme d'un triangle dont la base repose sur le bord du palle, et le sommet se trouve au cœcyx. Mais si l'on fait prendre au cadavre la position que l'on donne au malade pour l'opération de la taille, le triangle est renversé; les deux angles de la base sont aux deux branches ascendantes de l'achène et le sommet à l'extrémité antérieure de la symphyse pubienne.

Ces variations importent peu pour le moment, de même que le plus ou moins d'épaisseur de la couche de graisse qui rembourre le périsin et qui, en rapprochant et même en mettant en contact les osseux, fait perdre à la région cette forme triangulaire. Il est en ce plus dépendu de toutes les couches adipeuses qui reposent profondément et en bas la vessie, plus en bas la prostate et l'utère postérieur; enfin la portion membraneuse est en rapport direct avec le même plan.

Ces rapports peuvent être considérés comme constants, invariables; ceux qui établissent entre des osseux anguleux et le plan antérieur du corps sont des plus variables; et partant les règles pratiques que l'on en tire le sont souvent. Il est tout aussi variable

antérieur, ce qui d'ailleurs n'est nullement remarquable et de plus, d'ailleurs l'on donne le périsin à son profil, parce que les osseux qui s'y projettent sont la complication n'est donné des résultats que se rapprochent beaucoup de ceux obtenus par le cadavre, résultats qui dans les deux cas s'éloignent considérablement de la réalité parce que les osseux sont réellement indépendants l'un de l'autre par la solidité du fond ou du cadavre. Il est presque inutile de dire que les résultats que l'on obtient sont la conséquence de ce que nous avons dit de nombreuses dissections et qu'il ne représente comme le type de l'osseux solide et bien contenu.

d'établir des rapports avec l'axe du corps ou du bassin ou avec d'autres lignes, par exemple la ligne osseuse-coecygiennne, puisqu'elles varient suivant les circonstances ou par la vue ou par le toucher. Pour aller du connu à l'inconnu, j'ai toujours fait ressortir dans mon enseignement public l'importance du plan vertical; car il est invariable dans ses rapports avec les organes visuels, et quelle que soit la position que l'on donne au cadavre, on peut toujours s'assurer par la vue ou le toucher de sa position véritable, puisque'il est fixé par des points osseux (cartilagineux du coecyx, tubercules ischiatiques et symphyse du pubis). Il peut donc servir à nous donner des règles sûres pour les opérations. Pour rendre encore plus simple l'étude des rapports, on peut se dispenser d'étudier le plan dans son entier; il suffit d'en connaître seulement un diamètre, celui qui est dans la direction du plan médian du corps parce que l'œsophage suit dans son parcours ce même plan médian. Je ne prétends pas faire connaître ici non de nouveaux, mais les applications en chirurgie en sont pour le moins peu répandues parmi les praticiens. N'ignore-t-on pas que le coecyx est plus élevé que le pubis sur la ligne horizontale? Ne sait-on pas que le corps du pubis a une face qui regarde en bas et l'autre en haut? Mais la force de la routine est si grande que l'on continue encore aujourd'hui à les appeler face antérieure et face postérieure, ce qui n'est pas sans inconvénients pour les étudiants. Une ligne horizontale tirée du sommet du coecyx, P. I. b, rencontre le pubis vers le milieu de sa face supérieure, a, mais si à partir du coecyx on tire une ligne sur la face inférieure

du palais, et qu'en la proélonge, elle ne quitte la symphyse que vers son milieu, a. Cette ligne dans tout son parcours n'est pas tout à fait droite, mais à peine courbe. Pour en fixer les limites, le chirurgien n'a qu'à se marquer les points externes, b, c, (le nez et le milieu de la symphyse), avec deux doigts de la main droite avec un compas, ce que je ne saurais trop lui recommander de faire avant de peindre l'opération de la taille ou toute autre manœuvre sur l'urètre et la vessie. La profondeur du périnée, qui offre tant de variétés suivant les individus, dépend presque entièrement de l'abondance des parties molles qui sont situées au-dessous de cette ligne, tandis qu'au-dessus la hauteur du périnée est presque constante. Cette ligne légèrement courbe a une longueur de 11 centimètres, elle passe entre la prostate et le bulbe uréthral; elle rencontre sur son passage la portion membraneuse de l'urètre qui, ainsi que nous le verrons, en suit presque la direction. Commençons donc par dire dans la suite de cette ligne pour passer ensuite à la description de celles qui se trouvent au-dessous.

La vessie, m, est située dans l'excavation du bassin, et quand elle est distendue par une trop grande quantité d'urine, elle reboule au haut les intestins et se modèle sur l'excavation même. Elle prend alors la forme et la situation d'un citron couché sur une table; le petit bout se trouve en avant, et le grand extrémité va se cacher dans la courbure du sacrum. Quand la vessie est vide, elle ne ressort pas sur elle-même d'une manière uniforme; et si on se la représente divisée par le milieu par un plan horizontal, on

venir que la moitié supérieure s'affaisse et retombe sur l'inférieure. Les autres diamètres subissent peu de modifications : ce n'est vraiment que la moitié supérieure de la vessie qui varie beaucoup dans ses rapports, et il suffit de rappeler qu'elle peut atteindre et même dépasser l'ombilic. Les rapports de la moitié inférieure sont au contraire presque toujours les mêmes. On peut la diviser en trois parties : l'une antérieure qui repose sur la face supérieure du pubis, une moyenne qui est soutenue par l'agglomération périnéale profonde, au-dessous se trouve le prostate; enfin la portion postérieure est en rapport avec le rectum et les viscères voisins. C'est au milieu de la moitié inférieure de la vessie que l'on rencontre son orifice, *l*, qui s'ouvre et se continue avec le canal de l'urètre. Les apophyses péronéales, moyenne et supérieure, maintiennent fixes le prostate, *g*, et le col de la vessie, de telle sorte que si le col de la vessie peut s'éloigner ou se rapprocher considérablement du point perpendiculaire de la ligne coecy-pubienne, il ne peut guère changer ses rapports avec les deux points extrêmes, *h*, *a*, de cette ligne. Les nombreuses expériences que j'ai faites, me donnent le droit d'affirmer que le sphincter vésical est presque à égale distance de ces deux points, et que cette distance est de cinq centimètres. Je dois remarquer que le col de la vessie peut se déplacer davantage vers la symphyse que vers le coecum, parce que les ligaments pubiens empêchent le déplacement dans cette dernière direction. Si la vessie n'est pas très-dilatée et si elle ne contient pas de corps étranger, passant et libre dans sa cavité et si le prostate a son volume normal, le point le plus bas est le col; dans le cas contraire les parties qui

supportant le vésis, s'étend différemment sous son poids. La partie postérieure du demi-ovaire inférieur de la vessie, qui est le trigone vésical, descend alors dans un plan inférieur, et le trigone vésical s'affaisserait encore davantage s'il n'était soutenu par les aréoles d'une part et entièrement par la prostate, qui est maintenue par l'épandresse péricula profonde. La forme triangulaire du trigone dépend certainement de ces deux supports latéraux et postérieurs et de la prostate qui le supporte antérieurement. C'est là qu'ordinairement place la pierre qui, après l'évacuation de l'urine, vient heurter contre le col. Si elle est petite elle sort, si elle ne peut passer elle occasionne peu à peu et en raison de sa grosseur un relâchement et une distension du col vésical. Si l'on avait réfléchi à ce fait, on ne se serait pas donné la peine d'entreprendre des expériences sur le cadavre pour démontrer l'impossibilité de la distension du sphincter vésical dans la cystotomie. Les fibres musculaires du sphincter à l'état de vie peuvent être considérablement dilatées, ce qui devient impossible sur le cadavre, bien plus, chez ceux qui ont la pierre, le sphincter est lentement préparé à subir une grande distension par le calcul lui-même. L'orifice de l'urètre qui est ainsi, ainsi que je l'ai dit, au centre de l'ovaire inférieur de la vessie, se trouve éloigné du milieu de la ligne coccy-pubienne d'un centimètre et demi, ou un peu plus, suivant la grosseur de la prostate qui, si elle est volumineuse, non seulement s'écrase vers la pélicule et le diamètre court du rectum, mais encore déplace en haut et de quelques millimètres le col de la vessie. La ligne qui à partir de l'extrémité postérieure de la apophyse, c, se dirige

en haut et en arrière jusqu'à l'orifice vésical, il a une longueur de trois cent; et la distance qui sépare le col de la vessie de l'anus, C, est également de trois centimètres. L'urètre descend perpendiculairement du col de la vessie sur la ligne côney pubienne, et forme un angle obtus en abouchant la prostate. L'urètre prostatic qui prend date en ensemble une forme ovale, parce qu'il est comme étranglé à ses deux extrémités. La pari postérieure, en bas, fait un croce qu'elle se croise dans la prostate elle-même, et aussitôt après se trouve la limite entre cette partie et la membrane. Nous rencontrons ici une de ces erreurs traditionnelles que les chirurgiens ont adoptées, les yeux fermés, depuis si longtemps. On donne pour règle dans la cystotomie péronée de respecter les limites de la prostate. Si l'incision d'un seul diamètre ne suffit pas, tailler, en, dit-on, deux-trois et même quatre. On est allé jusqu'à vouloir donner des démonstrations géométriques. Je ne dirai rien de l'erreur commise en considérant un double diamètre avec une conséquence. (1) Je ne dirai rien de l'autre erreur que, tout en faisant plusieurs incisions, on ne prévient d'exprimer la prostate qui n'en reste pas moins tout entière et qui doit bien occuper quelque place. Accordons encore que la prostate ait été enlevée; et qu'à sa place on mette un calcul; si l'enveloppe

(1) En effet on croit dans ce pays, qu'une prostate qui soit comprimée de 10 millimètres, soit 10 millimètres en d'autre pas ou est le passage à une pierre qui sera 10 millimètres de diamètre mais croit-on 10 millimètres de circonférence, soit 12 de diamètre, ce qui est bien différent; et encore l'erreur est double que les deux apophyses prostates par les deux incisions peuvent former un cercle, ce qui est bien invraisemblable.

est toute saine, en celui qui ne sent pas plus gros que le prostate sent bien petit. Mais par où passeront tous les calculs plus volumineux ? Qui sera assez habile pour ne pas entrer avec le bistouri l'apophyse latérale ? Mais il ne faut pas oublier que le pierre est dans la vessie, et que pour l'en extraire il faut le faire passer à travers le prostate dont la circonférence a dû être respectée. Mais comment le pierre pourra-t-elle s'y engager ? le prostate (qu'on le représente, si l'on veut, comme un tesson qui entoure l'urètre, ce qui n'est pas) présente une ouverture qui est traversée par le calibre de l'urètre : elle touche la vessie par sa surface qui sera entamée, avant que le couteau aie coupé l'urètre. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de dilater sans couper, ou couper d'ent-le-dire dépasser les limites de la prostate. Mais que dire de ceux qui, après avoir introduit dans la vessie un lithotome caché à une ou deux lames, après l'avoir ouvert, le retirent en coupant de dedans en dehors et qui ainsi la prétention de ne pas avoir dépassé les limites de la prostate ? Pour moi je ne me flatte pas d'arriver à un tel résultat, je coupe évidemment toute la prostate ; et après en avoir dépassé les limites avec une incision, je crois qu'il est inutile d'en faire d'autres. Ce que j'ai dit plus haut me donne plus de confiance, dans le plus grand nombre des cas, dans la dilatation du col de la vessie qui, à mon avis, peut élargir momentanément l'apophyse de plancher forme par l'apophyse profonde entre le prostate et la vessie ; par conséquent je me dispose de porter l'incision, jusque sur le col vésical, que je me borne à dilater graduellement. Au moyen de cette manière de la

prostate et de la dilatation j'en extrais des calculs volumineux dont l'un n'avait pas moins de 34 centimètres de circonférence et j'ai obtenu les plus beaux résultats. Et ma presque manque d'insécurité, j'en appelle à l'immense pratique de Chevrolat, l'un des plus heureux opérateurs de la pierre. (1) Mais revenons à notre sujet.

La portion membraneuse de l'urètre se continue avec la précédente sous un angle obtus et même presque droit, en sorte que pour s'engager dans le bulbe elle descend d'un centimètre environ et se porte d'avant en avant, elle suit presque la ligne coccy-pubienne et ne s'en élève que pour s'enfoncer dans le bulbe. C'est à cet angle obtus que je place la limite entre la portion membraneuse et la prostatique de l'urètre. C'est là que l'urètre est le plus proche du rectum. Aussi dans ce, pendant le cathétérisme, on tient un doigt dans la dentelle courbure de cet organe l'extrémité de la sonde touche presque le bout du doigt, lorsque elle se trouve sur le point de s'engager dans la prostate. Ce qui est très-important, car au point de vue chirurgical on peut considérer l'urètre comme rectiligne jusqu'à cette limite; en admettant bien entendu, que la verge soit située dans une direction donnée qui est le prolongement de la ligne coccy-pubienne. Au delà, l'urètre change de direction et fait un angle presque droit que l'on tire la verge valant que l'on veut, on ne pourra faire disparaître cet angle, les ligaments qui viennent

(1) Chevrolat croit que c'est la prostate dilatée en avant et de behind en dedans) qu'elle limite de la prostate respectif—il dit F

la pince à la symphyse s'y opposent. Le cathétre rectiligne n'est possible pour cette raison que par le moyen suivant : Le sonde droite, arrivée sur l'angle obtus qui sert de limite à la portion membraneuse et à la prostatique, représente alors un levier de deuxième genre ; elle a son point d'appui sur l'extrémité de la prostate, la puissance est au perrillon, les ligaments de la portion bulbeuse et l'éponévrose moyenne qui marque la limite de cette portion avec l'urèthre membraneux, forment la résistance. Abaissons le perrillon, et la portion bulbeuse et la membraneux tendront à se mettre sur la même ligne que l'urèthre prostatique, tout en ne s'y plaçant pas parfaitement, puisque la résistance ne peut-être entièrement surmontée. A ce point de l'opération, on doit transformer le sonde en un levier de premier genre ; on prend le point d'appui sur l'extrémité de la portion bulbeuse (éponévrose moyenne péridurale) ; la pointe de la prostate devient la résistance ; et en abaissant le perrillon, c'est-à-dire la puissance, naturellement on soulève la pointe de la prostate, et l'urèthre prostatique prendra la direction de la portion bulbeuse et de la membraneuse, l'angle sera disparu. Je distingue ainsi la manœuvre opératoire en deux temps, ce n'est que pour en faciliter la description, et une main exercée, conduite par un tact exquis, exécute tous ces mouvements sans s'arrêter et sans qu'il soit besoin de préciser les divers temps de l'opération (1). L'angle dont je viens de parler, est à égale distance

(1) Il est un cathétre rectiligne qui a le bon inconvénient de servir au point de vue précédent, mais qui ne peut servir à l'opération sur presque tous les uréthres, on peut causer l'écoulement blanc avec cette manœuvre en soulevant le point de la prostate avec le bout du doigt introduit dans le rectum.

de l'anus et du sommet de l'arcade du pubis; cette distance est de deux centimètres-et-demi et il se trouve à cinq centimètres et demi de la pointe du coccyx. Passons maintenant la ligne coccy-pubienne et venons à l'examen des parties de l'utérus qui sont au-dessous. C'est la portion membraneuse qui doit d'abord nous occuper : elle suit à peu près la direction de la ligne coccy-pubienne qu'elle touche en bas pour s'engager dans le vagin, d'une longueur d'environ un centimètre et demi, elle est légèrement incurvée en bas et en avant, et se rapproche du sommet de l'arcade pubienne; ce qui fait que tandis que son extrémité postérieure en est éloignée de deux centim., elle ne l'est tout au plus que d'un centimètre, d., à son extrémité antérieure. L'utérus néanmoins ne s'implante pas sur l'extrémité du vagin, mais bien sur un point de sa face supérieure; il glisse pendant un court trajet, environ 1 cent., sur le vagin qui le protège et lui sert, pour ainsi dire, de coussinet. Cette partie libre du vagin, c., est, suivant l'âge et suivant d'autres conditions individuelles, plus ou moins étendue, plus ou moins vierge de l'anus. En général, elle en est éloignée de 18 millimètres. Les fibres des muscles et desaponévroses du périnée se dirigent toutes vers le rectum, il n'en est que la ligne médiane est dense, serrée et très-élastique; d'est comme une corde tendue entre l'anus et le vagin de l'utérus, elle est encore renforcée et se continue avec un plancher ligamenteux dont la description que nous croyons très-importante fait le sujet de la note suivante (1).

(1) Le muscle de Wilson, ou contracteur et se joignant avec l'anus par membrane, s'élève insérant à la partie libre du vagin, il se

Dans la taille latérale l'incision ne dépasse pas cette corde, on est obligé d'aller chercher le col de la vessie par une ligne oblique, ce qui est loin d'être le chemin le plus court. Cette corde tendue empêche en outre l'affaissement des tumeurs qui forment le périnée; or si, au cas où cet obstacle, se présenterait bien plus tardivement à la pression exercée par le mass de l'opérateur, et l'on rencontrerait plus bas le col de la vessie. En dernier lieu, si la pierre est grosse, cette corde tendue s'opposera, au moment de l'extraction, à la dilatation nécessaire de la plaie. La taille latérale ne présente pas les mêmes inconvénients, et si je ne me trompe, ce n'est pas à l'échec de l'incision interne que la taille latérale doit cet avantage, mais bien plutôt parce qu'on y coupe le réplé, cause principale, suivant moi,

des impuissances; il y a donc entre l'incision sous-cutanée et la taille latérale une grande différence.

L'opérateur ne craint d'inciser, au vu et au toué, une tumeur des tumeurs du corps vésical; et on pouvait sur la taille elle s'abaisse entre celui-ci et le corps vésical. Après que ses deux bords, le gauche et le droit, se sont élevés à égale hauteur, elle se protège contre pendant un instant, car, en l'absence de réplé, dans la position du corps vésical, son péricoste ne se soulève et que l'incision latérale. Il suffit de toute la ligne médiane de la surface de cette vésicule au plus élevée que s'élève sur le bas représenté de la position latérale. Et comme si plus à sa hauteur une hauteur d'un centimètre, il la rend, en quelques mots indépendance du corps vésical. Ce ligament qui ressemble à un anneau, comme un pont et l'urètre s'engage dans la taille, c'est-à-dire la sépare le monde de Wilson; et si le corps de l'urètre de la vésicule, c'est-à-dire à l'extrémité de son urètre. Et de la séparation des ses communications, il se trouve en situation pour à peu de temps. On peut dire que, de même que la portion libre de la taille est soustraite à l'urètre vésical, par sa plus grande hauteur, l'urètre latéral est également soustraite, par sa plus ou moins de hauteur, à tout le ligament à l'urètre que je viens de décrire. Les deux T ont été de

du désavantage de la taille latérale. Néanmoins la taille latérale n'est pas l'opération que l'on adopte de préférence, à cause des inconvénients qui lui appartiennent et que l'on reconnaît au grand nombre de praticiens, depuis la célèbre Marini de Barletta. Quoique Ferguson ait beaucoup à se louer d'une intuition latérale à l'ordinaire et unilatérale extrêmement, (accusément qu'il n'a pas tenté); et je l'ai vu mettre en pratique par mes maîtres Bognoli, Barci et Palasciano), néanmoins la taille latérale, malgré ses perfectionnements, est loin d'être exempte d'inconvénients, il suffit de rappeler l'un des principaux : la lenteur de la manœuvre avec tous les effets qui s'en suivent. En effet Ferguson en décrit les cinq opérations qu'il a pratiquées de cette manière,

Facile se fait dans le premier du corps creux, et y est le plus souvent effectuée qu'il est possible d'appréhender. Voici maintenant la description de l'opération. La tête libre de la femme est-ce qu'elle est le corps du pubis en devant que celle qui se trouve à celle de l'autre côté se pose au-dessus de celle de la symphyse, O, sous une la face extérieure du corps de pubis en l'angle la partie de la symphyse, se devant du p. m. O, sous une ou deux autres, une autre de la même face est l'écarter sans que tout le bord libre des branches latérales se trouvent d'écarter des branches latérales inférieures sous la face de deux autres, devant sur le pubis que se portent sur le corps creux; les autres qui partent de la symphyse de la symphyse s'écarter à la face droite du corps creux le long de la ligne latérale. Les autres se portent à gauche par la face supérieure de la face correspondante du corps creux. L'arc de ce triangle est rempli par les deux latérales, quelques fois, est rempli par quelques brins latérales. Sous l'autre, etc. L'un montrant le corps creux sur le pubis, se voit avec la description de son contenu et après l'opération du corps de pubis, se d'écarter, les deux autres se trouvent en un point plus près de l'infirmité supérieure de la symphyse que de l'infirmité.

font la même remarque. Mais n'y aurait-il pas un procédé intermédiaire entre la taille latérale et la bilatérale? Pour ne pas sortir de notre sujet, je décrirai mon procédé opératoire ailleurs sous forme d'appendice.

On voudra bien me permettre ces digressions qui, je le sais, entrèrent l'exposition des considérations anatomiques qui me restent à présenter, mais que la Commission ne trouvera pas trop déplacées, du moins je l'espère, car elles découlent naturellement de l'opportunité des faits anatomiques.

Nous nous sommes arrêtés dans le cours de notre description à l'aponévrose moyenne du pénis. Il s'ensuit, par conséquent, à parler des portions bulbourethrales et spongieuses de l'urètre. La finie de la portion bulbourethrale, il est dit, comme je l'ai dit, sur la ligne coccy-pubienne, à l'osion du sommet de l'arcade pubienne. C'est là le point de l'urètre qui peut le moins être déplacé, parcequ'il est tenu complètement embrassé par l'aponévrose moyenne, nous tenons dans ce point de division valétudinaire l'urètre qu'il ne reste à décrire, en deux portions, la bulbourethrale et la spongieuse ou uréthre de la verge. La démarcation entre ces deux portions, n'est pas sensible et correspond au point où les corps caverneux font un angle dans l'état de relâchement de la verge. L'urètre bulbourethral a une longueur de trois centim. et demi; sa forme peut être représentée par un gros haricot allongé, dont la bile toucherait l'arcade du pubis. En effet dans nos préparations en plâtre, il y a toujours à cet endroit une dépression caractéristique qui est faite par l'extrémité postérieure de la symphyse du pubis. On n'a pas sans remarqué cet étranglement de l'urètre embrassé

de chaque côté par le muscle bulbo-cavernosus, que l'on regarderait seulement comme accélérateur urinaire, mais je suis d'avis qu'il a encore un autre usage. Très probablement le sperme s'accroûte dans la portion bulbeuse pendant les derniers moments du coït, d'où il est éjecté avec force et à une assez grande distance par les contractions des muscles bulbo-cavernosus. La disposition de l'apandice moyenne est telle que cette éjection de l'urètre se fait surtout aux dépens de sa partie inférieure; il en résulte que l'urètre de l'urètre membraneux se trouve placé bien au centre et au haut, et il est facile à une main inexpérimentée de conduire le bec de la sonde dans le cul de sac bulbeux, et en le poussant, de percevoir la balle; c'est là la cause la plus fréquente des hémorrhôies qui surviennent pendant le cathétérisme. Au point où finit la portion bulbeuse et commence la spongieuse, l'urètre présente un léger rétrécissement, qui est peut-être le résultat du coudé que fait pousser constamment l'urètre en se point, et peut être aussi parce qu'il commence à avoir en ce point une adhésion directe et intime avec celui du corps cavernosus, comme je l'ai dit dans le note précédente. À partir de là, la portion spongieuse descend perpendiculairement, sa longueur est de 7 centimètres et demi. On admet qu'elle est assez variable, mais je dois pourtant faire une réserve. J'ai vu bien que cette partie de l'urètre varie d'individu à individu, mais chez la même personne, il n'y a pas toute la différence de longueur que l'on voudrait trouver, admettant que l'urètre ait eu été d'extension ou de rétraction. Je ne m'occupe pas ici de cette état de rétractilité, tant qu'il est occasionné par le froid ou les imprégnations menses; mais sous le poids à l'état de relâchement

et le pénis en érection, on ne rencontre pas cette grande différence de longueur à laquelle on pourrait croire du prime abord. Le verge, en état de repos, est appliqué contre la symphyse du pubis, presque jusque contre son extrémité antérieure, et ce n'est qu'à partir de là qu'elle se montre, tandis que la verge en érection prend la direction de ses racines qui sont attachées aux branches ascendantes des ischioques; elle s'éloigne de la symphyse, et commencent par conséquent à se montrer beaucoup plus en arrière. L'urètre spongieux se termine par une autre dilatation, la fosse urétrale, qui est formée aux dépens de la paroi supérieure, contrairement à ce qui a lieu pour le bulbe. En un mot mes recherches anatomiques confirmées par le clinique m'ont donné les résultats suivants qui représentent une moyenne, un type idéal.

1° La longueur totale de l'urètre est de 18 centim., à savoir :

Parties spongieuses	cent. 7 %
» bulbeuse	» 3 %
» membraneuse	» 1 %
» prostatique	» 1 %

 14

La différence d'un centimètre dépend de quelques millimètres qui se trouvent entre la portion le bulbeuse membraneuse et la prostatique. En outre les 18 centimètres peuvent être augmentés de quelques centimètres suivant le plus ou moins de développement du pénis.

2° L'urètre placé dans la direction de la ligne coxy-pubienne peut être considéré, au point de vue

chirurgical, comme rectiligne jusqu'au commencement de la portion prothétique; il est vrai de dire que cette ligne est très-légèrement courbe.

3° On se peut en même façon placer sur la même ligne droite la portion prothétique, quelle que soit la direction que l'on donne à la verge. Et pour pratiquer le cathétérisme rectiligne, qui son exécution est possible, mais encore assez souvent facile, il faut connaître le procédé que j'ai indiqué plus haut.

4° L'urètre n'est pas dans toute ses parties uniformément cylindrique; il présente même à l'état physiologique des varices, des évasements et des rétrécissements qu'il est important de bien connaître.

a) Les varicoités que l'on rencontre dans les trois dilatations ou ampoules de l'urètre, se trouvent: la première, sur la paroi supérieure de la fosse naviculaire; la seconde, sur la paroi pénulTime de la portion bulbeuse; et la troisième, sur la paroi postérieure de la portion prothétique. On trouve en outre le long de l'urètre spongieux des replis valvulaires sur la paroi qui tapisse le sillon externe.

b) On rencontre les rétrécissements physiologiques à deux cent de l'orifice urétral, à six fois la fosse naviculaire, à 7 centim. et demi à peu près du méat urinaire, à où l'urètre fait un angle à l'état de repos, c'est-à-dire à la limite antérieure de la portion bulbeuse: à 10 centim. et deux centim. du même orifice, ou si l'on veut, à un centimètre au-delà du bord de l'arcade du pubis, point où commence l'urètre membraneux, on rencontre encore à deux centimètres au-delà, toujours sur la ligne coccy-pulvéque, un rétrécissement qui est situé à l'origine

de la portion prostatique. Enfin, comme le sphincter (valvule vénale) est plus relâché dans son segment postérieur, il donne lieu à un dernier obstacle physiologique. Dans tous ces points, le chirurgien devra rencontrer des obstacles au passage des instruments, et pour les surmonter, on ne peut donner des règles générales. La forme, la dimension, la rigidité, la flexibilité des instruments que l'on emploie suggéreront à l'opérateur les règles, les procédés et même les artifices qu'il devra employer pour surmonter aisément et sans force ces obstacles physiologiques.

SUR LES RÉTROCESSIONS DE L'URÈTHRE

DÉFINITION.

Après avoir ainsi étudié l'anatomie de l'urètre en vue de notre sujet, et établi que cet organe, même à l'état sain, présente des dilatabilités limitées par des rétrocessions, j'exposerai quelques idées sur la maladie connue sous le nom de rétrocession uréthrale, afin de pouvoir parler ensuite des moyens de traitement que j'ai inventés depuis quelques années et qui m'ont donné les plus heureux résultats. Deux mots sur le sujet la définition de cette maladie. L'urètre ne fonctionne que pendant quelques instants; après quoi il a de longs intervalles de repos, à tel point que le repos peut être considéré comme son état normal. Lors de présenter alors un canal béant, comme ferait un urètre de l'uracée, l'urètre est aplati sur lui-même, surtout dans ses parties étroites; et s'il n'était capable de dilatation, il ne laisserait point passage, même à un cheveu. Si l'urine écoule en cet endroit de la difficulté à passer et s'échappe sous forme de jet très-fin, on ne peut rigoureusement avancer que l'urètre s'est rétréci; mais il sera plus convenable de dire qu'il a perdu sa partie de dilatabilité. Le canal de l'urètre peut

peut être obstrué par une végétation, un polype, et même une tumeur osseuse librement et à plein jet, et le canal est devenu plus étirable, tout en continuant et en tenant serré le polype à l'état de copes. Je ne crois pas qu'il soit totalement hors de propos de faire cette remarque; car le mal nécessairement de l'urètre doit avoir eu par lui-même une grande influence sur la manière de voir généralement adoptée au sujet de l'altération pathologique qui représente la maladie. Prenons un des cas que l'on rencontre le plus ordinairement dans la pratique. Voilà un individu qui a eu plusieurs hémorrhagies, quelques temps après, en général après plusieurs années, il s'aperçoit que le jet de l'urine s'altère, il n'est plus aussi gros qu'auparavant; il ne décrit plus une parabole; il est biffé. Le malade sent que l'urine librement sortie de la vessie, éprouve un obstacle en un point de son parcours. Les soufflans qui d'abord sont passés inaperçus, vont graduellement en augmentant, et le jet de l'urine n'est jamais revenu, même une seule fois, à son état normal. Les crises d'uriner sont devenues plus fréquentes, parfois elles ne peuvent être satisfaites de suite; chaque miction demande beaucoup de temps, oblige le malade à des efforts; et quand elle est terminée, il continue encore goutte à goutte un peu d'urine du résidu. Ordinairement l'urine est limpide, les fonctions intestinales régulières, et la santé en bon état. Quand on veut introduire une sonde en métal ou en gomme élastique, droite ou courbe, elle s'arrête en un point donné; et les règles qui peuvent nous servir pour surmonter les obstacles physiologiques, ne sont ici d'aucune utilité, tandis qu'un instrument flexible et

plus fin, après quelques jours, finit par passer comme s'il descendait une marche d'escalier, et arrive finalement dans la vraie. On commence un traitement par dilution : chaque jour on rencontre moins de difficulté à passer des instruments de plus en plus gros, until l'utérus reprend sa fonction normale. En présence de cet ensemble de symptômes, le praticien n'hésite pas à déclarer qu'il s'agit d'un rétrochement morbide de l'utérus. Il n'en est pas ainsi pour d'autres, et surtout pour ceux qui avec la permission de dicter la pathologie du bas de la table de dissection proclamant qu'on ne doit donner le nom de rétrochement qu'à ceux qui sont formés par un épaississement phlogistique de la paroi utérinale, formé par un tissu de nouvelle formation. Devons-nous admettre une telle définition et par conséquent une telle opinion nomenclaturique? (1) Certes je ne veux point diminuer l'importance de l'anatomie pathologique, mais je donne le pas à l'observation clinique. En effet celle-ci étudie la maladie sur le vif tandis que sur la table de l'anatomiste gît le cadavre de la maladie et non la maladie elle-même. Nous ne pourrions jamais nous entendre sur ce sujet avec ceux qui confondent en une seule et même chose l'état morbide et l'altération anatomique ; car l'altération anatomique que nous avons sous les yeux ne représente qu'une partie, et peut-être la moindre de l'état morbide. Mais ce n'est point ici le lieu de nous

(1) Sous ce heading, par exemple, tout ce l'altération, de l'état morbid anatomique (tissu de nouvelle), parce qu'elle se présente au moment (2 ou 3-4) qu'elle se peut trouver dans le diagramme géométrique sur la nature des rétrochements.

engager dans une discussion si importante de pathologie générale. Un individu qui a un rétrécissement, s'adresse tel ou tel au médecin s'il éprouve quelques souffrances, dans le cas contraire il passe sa vieillesse dans le silence sans s'inquiéter de ce qu'on pense l'asthénisme. Sur cent malades que le médecin entreprend de traiter, il s'en trouve au moins quatre vingt-dix qui guérissent. Que peut nous révéler l'anatomie pathologique sur tous ces cas qui sont de beaucoup les plus nombreux? Ordinairement les observations contemporaines sont faites sur quelques cas qui ont résisté à tous les traitements, et dans ces cas les moyens de traitement n'ont-ils pas eux-mêmes causé une partie de ces altérations qu'observe l'anatomiste? Quel sera le guide qui le conduira à distinguer les lésions qui sont le fait du traitement de celles qui représentent le rétrécissement? D'autres observateurs procèdent différemment: on se met à disputer dans les salles de dissection tous les crânes qui se présentent sans connaître le cours du monde les souffrances éprouvées, durant la vie, par les individus dont on dissectionne les cadavres. Sur 100 crânes étudiés de cette façon, l'anatomiste rencontrera 3 ou 4 cas d'épiloë-lement du péricèphale produit par l'induration ou de rétrécissement de calibre du canal. Cela ne nous donne pourtant pas le droit d'affirmer que ces individus ont éprouvé durant la vie les souffrances causées par les rétrécissements, parce que nous ne pouvons pas juger sur le cadavre du degré de distensibilité de l'artère. Et par contre, souvenons-nous surtout d'affirmer que sur les autres 96 ou tant d'individus, aucun n'avait présenté, durant la vie, les symptômes d'un rétrécissement? Ainsi donc les

artérios que l'on trouve avec la paroi épaisse par inflammation, ou par un tissu de nouvelle formation, (friction comme en compagnie du nombre des individus qui sont affectés de rétrécissements) ne peuvent nous servir de règle pour établir le lien anatomique de tous les rétrécissements. On ne peut pas plus admettre qu'il existe entre eux une simple différence de degré, parce que cette supposition ne réside pas à un examen rigoureux.

Examinons la question de plus près. Vous, suivant moi, les principales questions que l'on peut soulever :

1° Il est bien de croire que sur cent individus affectés de rétrécissements, 40 au moins ont eu la blennorrhagie; mais le vrai crime leur peut être bien souvent *infériorisé* par. Remarquons d'abord qu'on a invoqué l'inflammation pour expliquer les dépôts de lymphes plastique plus ou moins organisée, qui, en épousant l'artérios dans des points localisés, en rétrécissent le calibre. Mais s'il en était ainsi, comment se rendre compte de l'apparition si tardive des symptômes de rétrécissement, qui ne se manifestent quelquefois que plusieurs années après l'artérios ? Prenons, par exemple, la statistique de Thompson : sur 164 cas attribués à la blennorrhagie, les rétrécissements se manifestent de cette dix, dix seulement; on ne les voit dans le plus grand nombre qu'après une, trois ou quatre années, et même dans quelques cas après 8, 10, 20 ans et plus que la maladie se manifeste. Que l'on ne dise pas que les rétrécissements ont commencé pendant la blennorrhagie et se sont accrus peu à peu pour s'annoncer des obstacles mécaniques qu'après un long temps, car tous les malades vous

disent que pendant une ou plusieurs années le jet de l'urine n'a été nullement altéré, et la plupart vont répéter que tout d'un coup, sans cause bien appréciable, ils se sont aperçus pour la première fois de quelque difficulté d'uriner, une, deux et même plusieurs années après avoir quitté la gonorrhée. À partir de ce moment la difficulté va toujours en augmentant graduellement, le jet est de plus en plus fin, il est lancé moins loin, de temps en temps le stérécité survient. En un mot en prenant pour point de départ la guérison, le plus grand nombre des malades indiquent deux périodes entre la guérison et les premiers indices d'un obstacle à la miction, il se passe une époque (ordinairement une ou plusieurs années) où le malade n'a ressenti aucune inconvénient. C'est alors qu'il s'attendait le mieux à souffrir d'une rétroaction d'urine qu'il entre dans la seconde période que l'on pourrait appeler de formation du rétrécissement. Mais cette marche de la maladie ne s'accorde point avec la production d'écoulets phlogistiques, ou, pour mieux dire, avec l'évolution et les métamorphoses de l'écoulement inflammatoire.

2° Les indurations ou épaississements inflammatoires disparaissent le plus souvent avec le temps. On admettait ce fait lorsque l'on considérait ces indurations comme de simples infiltrations de matière albumineuse; on l'admet également aujourd'hui que l'on attribue cet épaississement de tissu à une véritable hyperplasie formée par la prolifération du tissu conjonctif. Si les constatations de l'urètre étaient véritablement maintenues par cet épaississement de la paroi ou, en d'autres termes, par la présence du tissu inflammatoire, pourquoi n'en verrions-nous pas un grand nombre

gagner spontanément? C'est ce que je n'ai pourtant jamais vu; et quand un strictisme est bien déclaré, il peut faire des progrès plus ou moins lents, mais il va toujours en augmentant et ne revient pas en arrière.

3° Le processus physiologique a une tendance naturelle à se limiter, mais il est loin de le faire par une ligne ou par des lignes espacées çà et là. Si l'urètre était épars par l'inflammation, elle devrait l'être dans une portion de son parcours; partant les rétrécissements devraient ressembler à une virule qui embrasserait le cul-de-sac du canal, se trouvant avec ou contre la plus souvent la courbature formée par un déviation, comme si une corde était tendue ou si un anneau serrait le canal?

4° L'urétrite a son siège de prédilection dans la fosse naviculaire et dans la portion antérieure de l'urètre spongieux; on la rencontre plus rarement dans la portion bulbaire. La syphilis du col de la vessie s'est pas non plus bien vue dans le courant d'une blennorrhagie, et elle est accompagnée avec souvent, surtout chez et contrairement à l'opinion commune, de l'induration de la portion prostatique. En résumé, l'urètre membraneux a le moins de tendance à s'enflammer et pourtant il est, sans contredit, le siège le plus fréquent des rétrécissements, tandis que la blennorrhagie, par ordre de fréquence, a son siège précisément opposé! En comprenant la portion membraneuse entre ses deux crises qui en marquent les véritables limites, nous pouvons franchement dire que là se trouve le siège de prédilection des rétrécissements urinaires (1). On rencontre une certaine na-

(1) En effet Lamy (*Études sur l'urètre* 1856, p. 10), écrit ainsi que le plus grand nombre de lésions se trouvent l'urètre mem-

thèse se loge presque constamment dans la fosse maxillaire ou dans la portion bulbeuse, la membrane qui échappe presque toujours à l'inflammation, n'est pas même le plus fréquemment le siège des rétrécissements.

Si la cause du rétrécissement se trouvait dans un épaissement de la paroi utérine avec considérable pour oblitérer le collem du canal, on devrait sentir un noyau, une induration en ce point, comme on effet j'en ai vu sentir quelques-uns. Mais on saitant de voir ces cas qui sont très rares, le plus souvent c'est un amincissement de la paroi que j'ai rencontré au niveau du rétrécissement, ce dont on peut mieux s'assurer encore quand l'instrument a traversé entièrement l'utérus. Les praticiens ont remarqué qu'au siège de la constriction, ce sont ordinairement comme une écharde, il s'arrête à portée de la membrane bulbeuse. Il est plus dur et offre plus de résistance, ce qui portera à croire qu'il y a là un rétrécissement de la paroi avec amincissement et non un épaissement. Et malgré cela, on continue à admettre la présence d'un nouveau tissu dans le rétrécissement?

Il faut, voilà sont rétrécissements à traiter: les autres guérissent au moyen de l'introduction de bougies en cire, d'introducteurs des moyens plus énergiques, un traitement de quelques jours suffit pour quelques uns, tandis que d'autres résistent plusieurs mois; les uns doivent être traités, les autres même d'autres après avoir eû à un premier traitement, se résout avec la plus grande facilité tandis qu'une partie d'autres eux ne repart plus; enfin d'autres résistent à tous les moyens et se gué-

ment jamais. Avec une telle diversité de manifestations et de résultats, devons-nous admettre que tous ces symptômes soient étroitement dépendants par une seule altération anatomique, et que toute la différence n'est que du plus ou moins? N'est-ce pas aller directement contre les enseignements de la clinique, je dirai plus, contre les règles de la plus saine logique, puisque tout d'effet diverse découlerait d'une seule et même cause?

Ces considérations sommaires nous portent à croire que la lésion anatomique ne doit pas consister en un épaississement de la paroi artérielle, ou, pour le moins, que cette altération est peu d'être constante, ou ne peut donc admettre la théorie qui généralise ce fait à presque tous les rétrécissements, et par conséquent la diffusion qu'on en donne est erronée. Quant à moi, fidèle à l'observation clinique, je préfère définir ainsi la maladie « toute altération matérielle » de la paroi de l'artère limitie à un ou plusieurs « points, qui s'opposent plus ou moins complètement » à sa dilatabilité, et qui donne lieu avec plus ou « moins de difficulté » à l'insertion de l'urine et à « l'introduction des instruments ». Mais on me dira: Nierons-nous que la plupart des rétrécissements ont été précédés par des gonflements? Faudra-t-il, par hasard, faire disparaître l'artère de l'étologie des rétrécissements? N'y aurait-il là qu'une simple coïncidence avec une maladie qui s'épargne que bien peu d'individus?

Aussurément non, entre l'uréthrite et le rétrécissement il existe un rapport de causalité bien manifeste, mais l'erreur consiste à vouloir rapprocher de trop près la cause de l'effet. On s'est d'abord occupé

de l'effet le plus immédiat et le plus ardu de l'inflammation. Mais on ne s'est pas demandé si le rétrécissement ne pourrait pas plutôt dépendre de quelque autre effet de l'inflammation même ordinaire et plus éloigné. Tout en restant comme démontré que l'atrophie est souvent la cause des rétrécissements, parce que c'est un fait clinique, voyons si elle ne les produirait pas de plusieurs manières.

Tâchons, sans idées préconçues, d'interroger le plus exactement possible l'anatomie pathologique pour les mettre d'accord avec les résultats que donne l'observation clinique.

REFLEXIONS CLINIQUES

SUR LES MÉTHODOLOGIES DE L'ENQUÊTE

PAR J. L. LAFITTE

Je professe l'opinion que la médecine, dans l'état présent, a plus à gagner encore avec la méthode analytique qu'avec la synthèse. Les classifications nosologiques sont un artifice utile pour faciliter l'exposition de la matière, mais il ne faut pas leur accorder trop de valeur. Lorsque sur un certain nombre de malades, nous rencontrons des phénomènes qui sont communs à tous, en même temps que quelques autres qui existent chez les uns et non chez les autres, nous sommes naturellement portés, grâce à cette communauté de phénomènes, à admettre que tous les malades sont atteints de la même maladie, tandis qu'il vaudrait bien mieux analyser les divers symptômes, les étudier avec soin pour voir s'ils font rapporter tous les cas à une seule entité pathologique ou bien les séparer en autant d'affections diverses. Comme nous sommes loin d'avoir une connaissance exacte et complète des maladies, nous ne sommes pas en possession d'une nomenclature convenable pour bien appeler les symptômes et leur donner l'importance que chacun d'eux mérite. Par conséquent nous sommes obligés de tenir compte des symptômes en bloc,

de leur complexité. Prenons par exemple des hernies dont le berge est devenue tout à coup irréductible : chez tous on observe une constipation complète ; chez tous le hoquet, les vomissements. Et pourtant qu'aujourd'hui avançons que toutes ces hernies sont en proie à un même et identique état morbide ? Les quelques phénomènes que les dix hernies ont en commun, montrent seulement qu'elles sont sorties de l'état physiologique et rien de plus. Nous allons aujourd'hui à la recherche d'autres symptômes qui ont beaucoup plus d'importance pour le praticien, puisqu'ils nous servent à élucider le mystère caché sous le processus morbide, et à nous faire diagnostiquer que parmi les dix hernies les unes sont enflammées, les autres étranglées, d'autres gangrénées, et que d'autres enfin présentent diversement accouplés ces différents états morbides. Et pourtant on les avait comprises auparavant sous une seule entité pathologique et durant les temps, les écoles et la mode, on aurait voulu voir chez toutes ou l'engorgement ou l'étranglement, ou l'infarctus. J'ai étudié avec le plus grand soin 55 cas de rétrécissements de l'intestin que j'ai eu à traiter, et tout en reconnaissant que tous présentaient un certain groupe de symptômes identiques, j'ai rencontré de telles différences, en les comparant entre eux, qu'il m'a été impossible d'admettre chez tous le même état morbide, le même processus pathologique. Aussi aujourd'hui en faisant le diagnostic de rétrécissement intestinal, je n'entends dire par là qu'un simple diagnostic générique, après quoi il me reste encore à établir un diagnostic spécial qui est de la plus haute importance, si l'on veut approprier à un cas spécial le

traitement qui lui convient. En prenant l'exemple cité de la hernie, je dirai tout d'abord que la hernie est devenue irréductible, ce sera là le diagnostic général, mais je devrai ensuite établir si elle est engorgée ou enflammée ou bien étranglée. Je pense qu'il en doit être tout à fait de même quand il s'agit des rétrécissements; et de même que la différence de diagnostic pour les hernies conduit à un pronostic différent, à un traitement tout opposé, de même le diagnostic spécial des rétrécissements devra être à des indications tantôt pour la cauterisation, tantôt pour l'arrèthotomie, etc.

Je ferai d'abord une revue sommaire de toutes les différences que l'on rencontre dans les phénomènes qui distinguent les nombreux cas de rétrécissements que j'ai eu à examiner, en me servant ensuite de mes recherches d'anatomie pathologique sur un grand nombre de dissections de l'urètre, j'indiquerai en quelques pages le nombre et la diversité des états morbides et des processus pathologiques de l'urètre qui, suivant moi, ont eu comme les phénomènes que l'on appelle par le mot, rétrécissement. Je classerai ces différences d'attributs en trois groupes, suivant qu'ils se rapportent à l'étiologie des rétrécissements, à leur symptomatologie ou à leur traitement.

Rétrécissements étiologiques.

1^{er} 35 individus avaient de 39 à 45 ans; 11 dépassaient 45 ans; 4 étaient entre 20 et 30; 2 seulement étaient adolescents.

2° Mes observations me portent à croire que les individus sanguins ou corpulents n'ont pas de dispositions marquées pour les rétrocessions. Ce sont plutôt les personnes maigres, instables, nerveuses qui y seraient disposées.

3° Les 3/4 des malades avaient eu des uréthrites, et en me fondant sur des probabilités, j'ai pu me convaincre que dans le plus grand nombre de cas s'étaient des blennorrhagies spécifiques. Cependant j'ai pu noter que quelques-uns n'avaient eu qu'une simple uréthrite des plus légères et de peu de durée, d'autres au contraire avaient souffert des blennorrhagies nombreuses et prolongées. J'ai pu encore me convaincre que la gravité des rétrocessions et leur résistance au traitement n'étaient nullement en rapport avec l'intensité et la durée de l'inflammation préexistante. Je dois même avoir rencontré des rétrocessions très-graves chez des individus qui n'avaient eu qu'une légère et courte uréthrite. J'ai connu au contraire un grand nombre d'individus, qui ont eu jusqu'à 10 ou 15 gonorrhées longues, intenses et graves qui pourtant n'ont éprouvé dans la suite aucun signe de rétrocession urétrale!

4° Aucun de mes malades n'avait probablement souffert de chancre syphilitique intra-urétral. Dans quelques cas, il ne m'a pas été donné d'établir si une maladie quelconque de l'urètre avait précédé le rétrocessionnement. Tous avaient certainement été précédés par un abcès de la prostate. Chez deux une cause traumatique avait produit la contusion et le rupture de l'urètre (spongieux en un cas, bulbeux dans l'autre). Ces deux cas se sont présentés chez les deux adolescents.

4° Je me suis convaincu que les injections que l'on a tant accusées, n'ont aucune influence directe sur la production des rétrécissements. Je ne me pas pourtant que dans quelques cas elles n'aient pu en favoriser le développement, mais toujours d'une manière fort indirecte. Chacun aura pu observer que dans les cas où les injections ne réussissent pas à arrêter la hémorrhagie, elles ne font souvent que l'alimenter, et que l'accablement cesse si l'on vient à interrompre les injections. Si dans ces cas, on s'obstine à employer les injections, à en changer presque chaque jour au lieu de les abandonner tout à fait, on ne fait que prolonger, indéfiniment la durée de la hémorrhagie précédant à cause des injections, et comme les rétrécissements ne produisent plus facilement après les hémorrhagies de longue durée, les injections exposent ainsi plus facilement aux rétrécissements.

5° Les premiers indices des rétrécissements ne se manifestent point pendant la guérison ou immédiatement après. Dans le plus grand nombre de cas, j'ai noté un espace de temps plus ou moins long (1, 2, 3, 5 ans et davantage encore) qui s'écoule sans que le malade s'it en le plus léger soupçon d'un empêchement à l'évacuation de l'urine. Le malade, en ressentant une souffrance, marque deux périodes bien distinctes qui sont séparées par ce temps de santé parfaite. Il dit que 1, 2 ans et plus encore après avoir souffert le hémorrhagie, il a commencé à éprouver, en urinant, un empêchement en un point du canal, qu'il ne savait préciser; c'est pourtant pour lui une sensation bien distincte qui lui fait perdre le sentiment de bien-être que l'on ressent à vider la vessie.

À cette érection qui suit constamment chaque érection, viennent s'ajouter tous les autres signes, etc. À partir de ce moment, les souffrances peuvent être plus ou moins fortes; mais comme tous, la maladie fait des progrès. On peut reprocher de ces cas ceux où la blennorrhagie a été légère et de courte durée, ceux encore qui n'ont point été précédés par une uréthrite appréciable; et chez tous on peut voir combien est faible et éloignée l'influence de l'inflammation et des strictures les plus primitives qui en découlent. À ces cas on peut en opposer d'autres où les symptômes des rétrécissements ne sont déclarés de suite après les blennorrhagies, et représentant une véritable succession morbide.

Différences statistiques.

1° Les différences sont les plus marquées pour les signes des rétrécissements, et on les atteste dans leur marche, leur durée, etc. Dans certains cas, tout l'appareil symptomatique se résume dans les déviations anormales. Le jet de l'urine est plus fin, il est balle, la miction arrive en saccade, etc. Toute l'inconcommodité consiste à rester plus longtemps pour vider la vessie, plus tard, à sentir briser des efforts pour éjecter de l'eau, etc.; mais rien de plus. Dans d'autres cas les souffrances sont bien plus considérables: l'urètre est la siège de sensations douloureuses, les crises d'urine sont fréquentes; l'érection de la verge, même incomplète, se produit très-difficilement, ou bien se fait avec douleur.

2° Quelques cas de rétrécissements sont toujours accompagnés d'une stricture naso-paralente, qui,

sous forme de goutte miliaire, est la compagne fidèle de la malade pendant toute sa durée. Dans d'autres au contraire ce n'est que par exception, pour un peu de temps que l'urticaire est bornée par un peu de liquide. Chez les premiers, la verge est toujours dans un certain état de tumescence, le méat urinaire est gonflé et rougeâtre.

3° Dans quelques rétrécissements, la marche est des plus régulières; on dirait qu'à mesure que l'urine les traverse, elle produit, pour ainsi dire des incrustations calcaires, qui viendraient diminuer chaque jour le calibre de l'urètre et empêcher en proportion le passage de l'urine. D'autres ont une marche irrégulière et intermittente. J'ai vu en peu de temps surgir les phénomènes graves des rétrécissements, *quidam* en sont un peu, pour retourner bien vite au même degré de gravité qu' auparavant, etc. J'ai pu remarquer qu'il existait chez quelques uns d'entre eux des différences très-sensibles, suivant les différentes heures de la journée, etc.

4° On dit que certains rétrécissements sont stationnaires, tellement leur marche est lente. Après 15, 20 et 30 ans ils sont encore sans supportables, sans avoir recours à aucun traitement, tandis que d'autres, en peu de mois, arrivent au plus haut degré de gravité, en suivant une marche constamment ascendante.

5° Je crois qu'il est très-important de tenir compte de la différence du siège. Je me suis toujours attaché à bien préciser la portion de l'urètre affectée. Voici les règles que j'ai suivies pour cette détermination. Il ne faut point s'en tenir aux résultats des premiers symptômes si ce n'est que nous rencontrons de grandes

difficultés et qu'il nous faut employer des instruments tels-*desclides* et très-fins. Mais, après avoir obtenu un certain degré de dilatation, on arrive au but plus facilement et plus sûrement avec des instruments plus valablement et mieux appropriés. En outre, considérant que le *portio membranaceus* et la *prostatique* sont d'une longueur presque constante, tandis que la *portio spongiosa* est très-variable, je ne cherche pas à saisir le contour de *conduits* de tout urètre, mais se trouve le rétrécissement, mais je m'applique plutôt à en préciser la distance à partir de l'orifice de la vessie. J'emploie une sonde fine en gomme élastique munie à son extrémité d'un renflement avec deux yeux latéraux ; j'introduis l'instrument jusqu' dans la vessie ; et en le retirant je fais une marque sur la sonde au moment où cesse le jet de l'urine. Je saisais constamment le gland à une distance déterminée de la symphyse, je continue à retirer l'instrument, et arrivé sur le rétrécissement, je marque un second point, il ne me reste plus qu'à mesurer la portion de la sonde entre ces deux points, ce qui me donne la distance du rétrécissement à l'orifice vésical de l'urètre. En parcourant extérieurement l'urètre avec le doigt, je tiens compte de l'endroit où l'on trouve le renflement de la sonde. En suivant cette manière de mesurer, j'ai trouvé, sur 53 individus, 2 rétrécissements sur le trajet de l'urètre *prostatique* ; 6 sur la *bulbe* antérieure de cette portion, 46 sur l'urètre *membranaceus* et particulièrement au point où existe un rétrécissement physiologique qui divise la *portio membranacea* et la *bulbe*. Quelque cette partie de l'urètre repose sur la *bulbe*, je la rapporte à la *portio membranacea*.

parce qu'elle n'est point embrassée par le bulbe, parce qu'elle est séparée par l'apophyse moyenne de l'urètre bulbeux qui est placé immédiatement en avant, et parce qu'elle a une limite antérieure assez sensible et constante. Il se rencontrent 14 rétrécissements au point qui sert de limite entre le bulbe et la portion spongieuse; mais 3 seulement à la limite postérieure de la fosse naviculaire.

6° On comprend facilement que quelques-uns de nos malades aient plusieurs rétrécissements. De là une autre différence qui n'est pas des moins importantes. Dans les cas de rétrécissements multiples j'ai souvent observé que le rétrécissement postérieur, c'est-à-dire le plus proche de la verge, était le plus fort et le plus réfractaire au traitement. Et pour le dire, en passant, les rétrécissements multiples ne sont presque jamais formés par du triphlogisme, mais découlent une autre cause et un autre processus pathologique.

Réflexions thérapeutiques.

1° Le traitement thérapeutique ne nous sert pas mieux à apprécier des différences très-marquées. Tout chirurgien qui s'en va à traiter un grand nombre de rétrécissements sans sans doute remarquer quelle grande diversité de résultats est donnée par les mêmes moyens de traitement. On rencontrera en cas où les bougies en bois franchissent facilement l'obstacle qui sera résisté à d'autres bougies de même calibre; tandis que les bougies en gomme élastique seront plus utiles pour d'autres rétrécissements; dans d'autres, ce seront en contraire les

longues métalliques, et sans de suite. Vous insérez même les uns avec les bougies coniques; les autres avec les cylindriques, d'autres enfin avec les bougies droites, etc.

2° Parfois le jet de l'urine semblerait indiquer un certain calibre, tandis qu'il faut se servir de bougies d'un numéro bien inférieur.

3° Il y a certains rétrécissements qui ne se laissent point franchir ou moins pendant les premiers jours; et il faut, pour ainsi dire, prendre l'urèthre par surprise. Dans d'autres, l'obstacle est simplement mécanique et passif.

4° J'ai observé dans ces derniers surtout que les bons effets du traitement se font sentir dès la première introduction d'une bougie, tandis que s'est tout le contraire pour d'autres: il faut suspendre le traitement parce que l'urèthre s'enflamme, etc.

5° Ceux-ci, après que la tétrancie s'est établie, éprouvent à leur tour les bons effets des bougies, et souvent on les guérit en peu de jours. Chez d'autres on observe une grande tolérance pendant quelque temps et jusqu'à des bougies d'un certain numéro. Après quoi le traitement ne marche plus avec la même régularité; et j'ai dû parfois recourir à une autre méthode pour obtenir la guérison. Le même traitement a un plein succès dans quelques cas en peu de jours; dans d'autres, il exige des mois.

6° Qui n'a pas observé que pour certains rétrécissements il faut modifier le point de l'urèthre avec des moyens chimiques? Qui n'a pas observé que parfois il faut employer la cautérisation? Qui ignore que parfois l'uréthrotomie est nécessaire?

7° J'en ai à traiter des rétrécissements qui,

une fois arrivés à un degré considérable de distorsibilité, par exemple au 5° 10, obtenu par la distorsion permanente, reviennent à leur état primitif, après quelques heures de repos.

8° Enfin, c'est une observation bien connue que quelques uns guérissent radicalement, sans qu'il soit besoin de prendre aucune précaution ; tandis que d'autres, traités avec attention, pendant très-long-temps et même au moyen de l'asthénésie, n'ont pas moins une grande tendance à se reproduire, et obligent le malade à introduire de grosses bougies à court intervalle, pendant plusieurs années, quand ce n'est pas durant toute la vie.

Toutes ces différences qui se rapportent aux symptômes étiologiques, étiologiques et thérapeutiques démontrent jusqu'à l'évidence que l'arthrite peut devenir le siège de plusieurs processus morbides différents, mais qui ont en commun quelques attributs. De quelle espèce et combien peuvent être ces processus morbides ? à ce point de la question, les progrès ou les attributs anatomiques peuvent jeter une grande lumière sur notre sujet, surtout s'ils ont été recueillis et étudiés dans une direction d'aspect toute clinique.

RESULTATS DES RECHERCHES

D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

—

Je ne puis naturellement m'engager ici dans l'exposition détaillée de toutes les observations anatomiques que j'ai faites depuis deux ans, je me borne seulement à formuler les résultats que j'en ai obtenus.

1° Le tissu de cicatrice, ce tissu réparateur qui remplace une perte de substance, forme un nombre très considérable de rétrécissements. Je puis assurer n'avoir trouvé que deux rétrécissements formés par du tissu de cicatrice et occasionnés par une lésion traumatique; ils étaient situés dans l'urètre spongieux et bulbaire.

2° J'ai rencontré moi-même, dans le courant de mes dissections, un nombre de rétrécissements par épaississement de la paroi urétrale et dus au processus phlogistique. L'irritation localisée donne lieu à une prolifération de cellules molles à de la matière amorphe, d'où l'hypertrophie du tissu conjonctif sous-muqueux. Cette infiltration d'un nouveau tissu non-seulement grossit la paroi, mais, en se produisant pendant que l'urètre contracté est en repos, elle lui fait perdre sa dilatabilité. C'est surtout par

cette cause que se produisent les souffrances du rétrécissement. Mais la formation directe des cas de rétrécissement par le tissu phlogistique, sans d'être fréquente, est en contraire assez rare. Je pense que ceux qui l'ont rencontrés partout, ne se sont pas livrés à un examen assez rigoureux. En effet j'ai bien souvent rencontré un épaississement phlogistique de la paroi uréthrale, mais en l'examinant avec attention, j'ai dû me convaincre qu'il n'était pas suffisant à lui seul pour gêner l'écoulement de l'urine, tandis qu'au même point de l'urètre on adhérait je trouve des lésions qui occupent beaucoup plus considérablement l'attention de la fonction uréthrale. Ce sont des altérations que je vais décrire.

2^e Je me suis fait bien souvent cette question Pourquoi le tissu produit par l'inflammation ne subit-il pas dans l'urètre les mêmes métamorphoses atrophiques qu'ailleurs? Bien souvent je me suis rappelé une observation définitive par un grand nombre d'auteurs et répétée plusieurs fois par moi-même. Si l'on parcourt entièrement l'urètre, on lui de suite un épaississement, un aggras, on arrive de la constatation, on rencontre évidemment une dépression, en d'autres termes une rétraction de tissu. Ce fait me portait à croire que parfois la lésion pourrait bien être une atrophie de la paroi affectée. L'entreprise dans ce but de nombreuses dissections, et j'eus la satisfaction de voir qu'elles s'accordaient avec mes vues et avec l'observation des cadavres. Je n'entreprendrais certainement pas ici dans la description, minutieuse des pièces anatomiques, je me contenterai de donner le résumé de mes observations. Une portion de l'urètre est à plusieurs reprises affectée par l'in-

déformation spéciale; en ce point, il se forme une hypertrophie du tissu connectif sous-muqueux; les éléments du nouveau tissu morbide peuvent s'insérer, s'insinuer dans les fibres voisines. Il se produit alors un épaississement de la paroi, étalé comme dans le papière affectée de conspécivité granuleuse. Et comme dans ce cas on peut avoir l'entropion, on peut de même rencontrer le colaire de l'ordinaire étiré, ce je puis m'exprimer ainsi, par une surabondance des couches plus intimes des fibres. Cette forme de rétrécissement, je le répète encore, qui pour d'autres est la plus fréquente, est en nombre pour moi la plus rare. En effet, l'inflammation une fois terminée, la translocation des fibres ne se prolonge pas, et il est bien sûr qu'au moins elle n'augmente pas. Qu'arrive-t-il souvent de ce tissu inflammatoire dans la conspécivité chronique après que l'inflammation s'est éteinte? Il suit des modifications rétrogrades, le tissu connectif s'atrophie, se rétrécit et donne lieu à l'entropion. Il en est de même pour l'ordinaire collé: l'ancien tissu s'est atrophié pour céder la place au nouveau, ce qui en pratique l'ancien tissu comme dit-on de là que je m'y méfie. Le tissu morbide disparaît ensuite par l'absorption; et il ne reste que le tissu normal atrophié.

4° Mais il y a plus: il arrive quelquefois que ces fibres duppées d'atrophie perdent leur distinctio; elles sont comme des échelles, plus fines, plus écartées, plus serrées les unes contre les autres, enfin elles forment un tissu qui, tout en étant plus mince, est pourtant beaucoup plus résistant et dont on peut se faire une idée mieux juste en le comparant à une matelasse de fibres filées, spongieuses: en un mot c'est

une véritable sclérose-albumine. On peut d'ailleurs avoir la sclérose sans ou sans atrophie de l'artère saine, comme on peut encore avoir la sclérose de l'artère phlogogastro-atrophie. On peut se dispenser de faire observer que de même que les nerfs de conjonction sont généralement guéris sans atrophie, un bon nombre grand nombre d'artérioles, même spirilliques, disparaissent sans lésion de rétrécissements. La sclérose peut envahir toute une portion de tissu conjonctif qui entoure la cavité de l'artère ou seulement un segment, de manière à former un rétrécissement en forme de valve plus ou moins longue, ou d'anneau ou simplement de bords ou de cordes tendus. L'élément vasculaire participe également à l'atrophie qui a frappé les autres tissus, et lorsque les injections réussissent bien, on aperçoit manifestement les vaisseaux injectés sur tout l'artère, excepté sur la partie qui est le siège du rétrécissement où l'artère ne présente aucune trace d'injection dans toute son épaisseur, et où les vaisseaux capillaires atrophiques sont passés à l'état de fibres de tissu conjonctif. Ce fait, intéressant par lui-même, sert encore à montrer que l'atrophie, lors de s'en tenir à la membrane, envahit également les tissus sous-jacents et même le tissu spongieux. L'épithélium correspondant subit également de graves altérations; il s'atrophie à un tel point que quelques observateurs ont prétendu qu'il disparaissait tout à fait. Les cellules se raccourcissent, s'aplatissent en forme de lamelles et présentent l'aspect d'un épithélium pavimenteux superficiel. La sclérose et l'atrophie forment donc la lésion anatomique d'un certain nombre de caractères, qui se caractérisent par tout d'abord un véritable effacement du canal

qui dans la porte plus ou moins grande de sa dilatabilité. L'artère dont les parois sont constamment en contact, après avoir perdu en ce point sa dilatabilité, ne se laisse plus distendre par le jet de l'urine, d'où la production de la diarrée. On comprendra avec peine que ces modifications du tissu normal sont indépendantes des métamorphoses atrophiques que subit le tissu phlogistique, en d'autres termes, on peut trouver l'atrophie des tissus physiologiques, en même temps que la nouvelle tumeur, affectée l'un et l'autre de sclérose. On rencontre plus spécialement ces rétrécissements dans la portion spongieuse.

S'il se ne s'agit pas de ranger à l'opinion de ceux qui nient l'existence des rétrécissements sporadiques. Qu'ils soient légers, facilement guérissables après quelques dilatations ou même après une seule introduction de bougie, il n'en est pas moins vrai qu'ils existent. Assurément on ne pourra pas les rencontrer dans les valves d'anastomie, mais le praticien a quelquefois à faire avec eux, aussi je n'hésite pas à les compter parmi les nombreuses espèces de rétrécissements que l'on a à traiter (1).

(1) J'ai eu l'occasion d'observer un rétrécissement compliqué quelquefois chez un jeune de 16 ans, affecté d'hygiène très prononcée. Elle commençait à éprouver une difficulté dans la miction, une urine trouble précédemment d'une immensité de trois années; et on trouva une immensité d'urine qui était devenue jaune que toutes seules et qui n'avait duré que quelques jours, pour devenir tout-à-coup une urine trouble. Cette immensité lui donna quelquefois même une forme de l'hygiène. Le diagnostic se présentait avec un jet de l'urine trouble, en sorte que le malade était obligé de faire beaucoup d'efforts pour uriner, l'urine était limpide, et même

Jusqu'à présent nous n'avons point résolu un problème des plus graves que nous pose l'observation clinique. Le siège de prédissection de l'artérielle est la fosse nasotympanaire ou la portion bulbeuse, l'inflammation ne franchit pas les limites de ces deux régions et surtout la limite frontière entre la portion bulbeuse et la membraneuse. Ce sont là des barrières qui s'opposent à la marche de l'inflammation et qui n'en sont point atteintes, et si l'on reconnaît dans l'inflammation la cause principale des rétrécissements, il serait naturel de les rencontrer sitôt partout ailleurs que sur ces barrières mêmes. Eh bien, comment se fait-il que ce soit pos-

sé, et ne voyant aucun obstacle non-pareille, la veine d'après laquelle dépendent, et la veine ne se vidant pas entièrement. Ces veineux s'écoulent et s'écoulent peu à peu et le mucus colore que on continue de pousser et on dit tout. Mais après avoir souffert pendant un mois sans que jamais le jet de l'urine fût troublé à l'écoulement, le mucus, par d'ailleurs, ne se laisse de résister aux efforts. Les veines sont très défectives, les urines qu'on colore à l'écoulement, le mucus, se résistent et ainsi on voit l'écoulement qui se résiste à l'écoulement, qui à tout à l'écoulement, est résisté par un obstacle. Je pense le mucus avec une force qu'on ne s'attendait, et après une première résistence pendant laquelle deux obstacles, l'écoulement de la veine et le mucus dans la veine. L'écoulement qui est tel des plus fréquents après que le mucus avec d'écoulement et à plus tard. Pendant trois mois, elle ne résiste pas le mucus, l'écoulement dans l'écoulement de l'écoulement, ainsi qu'on s'attendait le mucus, le mucus et l'écoulement résistent également, avec cette différence que l'écoulement résiste de la mucus à l'écoulement de la veine. Le mucus ne peut plus résister, je suis appelé à reconnaître avec cette fois le mucus résiste dans l'écoulement, et durant quelques jours, je pense une grande veine résiste, quoique le mucus est devenu tout à fait résisté après la première résistence. Tout doit qu'on est de grande et comme on ne résiste pas d'écoulement.

cieusement à que l'on rencontre les dix ou vingt-huit de tous les rétrécissements ? Qui pourrait nier que les deux tiers, 60 lyy au moins des rétrécissements sont situés à l'extrémité antérieure de l'urétère membraneux ? Voici comment se produisent, suivant moi les rétrécissements dans ce point du canal. Quand une portion d'un canal contractile, que ce soit une veine, une artère, un intestin, etc., est affectée d'inflammation chronique, elle perd sa résistance et sa contractilité, et se laisse distendre, dilater par l'écou de liquide qui la traverse. La portion de canal, une veine, après avoir subi cette distension, se trouve par exemple limitée par deux rétrécissements. Celle-ci qui se rétrécit presque constamment, n'est pas aussi inexplicable qu'on pourrait le penser. Il est probable que les fibres circulaires de ces deux points rétrécis du canal sont maintenues dans un état de spasme tétanique dû à l'élément irritatif de la partie intérieure inflammée. Supposons que l'inflammation ait envahi l'ampoule bulbeuse ; comme cette partie de l'urèthre est limitée par deux rétrécissements naturels, il s'en suit à plus forte raison que la contraction tétanique doit les resserrer davantage, et que l'urétère doit perdre, en ces deux points, une partie de sa élastibilité.

Je ne crains pas m'éloigner de la vérité en posant que les rétrécissements, qui sont situés en ces points et qui arrivent au chiffre de 60 lyy, apparemment souvent par cette forme squamiforme, et peuvent même s'arrêter là. Mais il arrive souvent que la portion de l'urèthre qui se trouve au delà de la bouillie bulbo-membraneuse, d'aut-à-dire du côté de la vessie, se dilate par le fait du jet de l'urine qui vient se briser

sur le rétrécissement et qui, en revoyant en arrière, fait un effet contre la paroi. Cette portion de l'artère ne tarde pas à s'enflammer, soit à cause de ces distensions répétées, soit par le fait de quelques gouttes d'urine qui y séjourne. Cette lésion entre la portion ballesse et le membraneux, qui auparavant servait de barrière à l'inflammation, se trouve maintenant entre deux portions d'artères enflammées, et s'enflamme à son tour. Dans cet état, elle peut être envahie par un nouveau tissu comme aussi la sclérose et l'atrophie peuvent s'y développer. Que ces altérations existent séparément ou réunies, l'étranglement physiologique du canal en ce point se transforme naturellement en un rétrécissement pathologique. On se trompe du tout au tout, si c'est là le processus pathologique, le fait anatomique que l'on rencontre le plus souvent dans les rétrécissements de l'artère. En réalité, j'admets cinq éléments producteurs des rétrécissements. Le tissu de cicatrice ou molleux que l'on trouve dans un très petit nombre de rétrécissements; la hyperplasie ou le tissu phlogistique, le spasmodique qui peut aller en augmentant graduellement, comme les autres formes de rétrécissement, sans que nous en ayons un exemple dans le cas cité plus haut; l'atrophie des tunics internes et la sclérose. J'admets que ces divers éléments peuvent, réunis ou isolés, former un rétrécissement. Cette explication, quoique sommaire, des observations anatomiques servira, je l'espère, à éclaircir bien des doutes qui s'élevaient sur la pathologie des rétrécissements. On comprendra comment les rétrécissements se manifestent souvent quelques années après l'artériosclérose, pourquoi de son existence si variée; pourquoi il sont si rares de pré-

Écrase sur les points notablement rétrécis; pourquoi les deux bords se rencontrent sur l'extrémité antérieure de l'artère manubriale, enfin pourquoi un même traitement produit des effets si différents? Ainsi l'observation clinique est en parfait accord avec les résultats anatomiques, ainsi ce qu'on appelle rétrécissement de l'artère ne doit pas être regardé comme une seule entité nosologique, mais bien comme une famille de plusieurs entités différentes qui ont en commun quelque caractère. En résumé, j'ai décrit cinq formes typiques de rétrécissements de l'artère:

1° Rétrécissement spasmodique.

2° Rétrécissement par tissu modulaire ou de caillots.

3° Rétrécissement par tissu phlogistique.

4° Rétrécissement par atrophie.

5° Rétrécissement par sclérose ou scléro-atrophie.

J'ajoute à ceux-ci une sixième forme: la forme mixte qui résulte d'altérations anatomiques compliquées.

Arrivé à ce point de mon travail, je devrais, en suivant la marche classique, revenir sur les résultats fournis par la clinique et montrer que par leur moyen on peut faire, en lit de malade, le diagnostic différentiel de chacune des altérations anatomiques spéciales et des processus pathologiques que nous avons définis. Chacun d'eux pourrait être le sujet d'une monographie à part. Mais j'ai déjà déclaré, dès le commencement, que je n'ai point eu l'intention de reproduire en entier mon travail sur le maître pour ne pas risquer de la complaisance de

la Commission, tout ce que je pourrais dire ne serait que des déductions, qui découleraient naturellement de ce que j'ai déjà exposé, par conséquent les membres de la Commission auraient bien les voir d'eux-mêmes à première vue, sans perdre tel du temps à faire des descriptions détaillées.

TRAITEMENTS DES RETRÉCISSEMENTS

Loin de me la présentation d'avoir été le dernier mot sur les rétrécissements; le but que je me suis proposé, n'a été que de combattre l'erreur qui consistait à considérer les rétrécissements comme une seule entité pathologique. Que d'autres aient le mérite de mieux étudier les divers états morbides de l'urètre, pour moi, je serai heureux si j'ai donné l'initiative de ces études, dont la clinique retire la plus grande utilité. Rappelons-nous combien imparfait était le traitement des lésions strictement irréductibles, avant qu'on eût déterminé les divers états morbides qui ont en commun cet étroit; rappelons-nous combien imparfait était le traitement de l'étréusement strictural avant que Dupuytren, démontrant combien il était erroné de considérer la lésion comme unique, ne l'eût divisée en trois états morbides assez divers, etc. Rappelons-nous quelle grande utilité ses distinctions ont apporté dans le traitement en précisant mieux les indications thérapeutiques; et nous ne pourrions hésiter un moment à croire que la pathologie des rétrécissements, arrivée au même perfectionnement ne jettera pas une grande

lancées sur les moyens les plus propres à leur guérison. En effet, avec une telle variété d'altérations anatomiques et de processus pathologiques, qui voulez-vous adapter exclusivement pour tous la même méthode opératoire? Ne sera-t-il pas plus naturel de faire dépendre d'un diagnostic spécial pour un traitement plutôt que pour un autre? Qui voulez perdre du temps à prescrire une diète ou un traitement, quand le diagnostic établit que ce cas spécial exige l'arthrectomie? Et par contre, faudra-t-il exposer le malade aux dangers de l'arthrectomie, quand on aura que ce strictement cédant vite et facilement à la diète? Voulez-vous abandonner la contraction, bien que maintenant elle ait été lésée dans l'œcil, par le plus grand nombre? Et les erreurs que nous fournit la méthode moderne, devons-nous les laisser tous de côté? Il n'en est pas moins vrai que la confiance ébranlée dans le traitement des rétrécissements, tantôt pour une méthode, tantôt pour une autre. Aujourd'hui c'est l'arthrectomie qui est portée aux cieux par l'empire de la mode! Il est vraiment incompréhensible que, lorsque tous les efforts des plus célèbres chirurgiens modernes tendent à élever les opérations angioplastiques, on donne la préférence à l'arthrectomie; et par qui encore cette opération est-elle préconisée? par ceux-là mêmes qui se déclarent les champions de la chirurgie moderne! Mais il ne sert à rien de s'élever contre le fustisme. Chacun se fuit sur de ses observations anatomiques, chacun se retient derrière ses propres résultats cliniques; tous croient en leur manière des mêmes erreurs, et si vous vous efforcez de braver celles de l'adversaire, on vous les deux côtés de suite, il retourne contre

trous le même argument. Le temps seul pourra mettre un peu d'ordre dans cette masse d'opinions diverses et opposées. Certes, mon nom ne vaît point pour recommander une pratique; mais les résultats sont assez éloquents par eux-mêmes. Fidèle à mes principes, je ne me suis pas attaché à une seule méthode, à un seul procédé; ce serait me ranger moi aussi parmi les fanatiques et les courtisans de la mode. Je m'attache à poser un diagnostic exact et complet, et, quant au traitement, j'ai recours, suivant les indications, à toutes les méthodes et aux procédés opératoires recommandés. L'emploi perle un traitement médical ou à quelques manœuvres chirurgicales des plus simples. Son efficacité se montre surtout contre les névroses spasmodiques et ceux qui sont constitués par du tissu phlogistique encore récent. Je trouve quelquefois utile le catarrhe localisé; surtout dans les cas formés par du tissu phlogistique, alors que l'induration est encore en vigueur et qu'elle est accompagnée par une sécrétion de mucopus mêlée à quelques stries de sang, et localisée au siège du rétrécissement. Il est probable que dans quelques-uns de ces cas, il existe des granulations de la membrane muqueuse que le caustique détruit. Dans les rétrécissements formés par du tissu hématoïde ou de cicatrice, dans ceux constitués par du tissu phlogistique ancien, clairs et abondants, je pense qu'il est non-seulement utile, mais encore nécessaire de pratiquer des scarifications internes; de là, la grande utilité des arithmes les plus récents. Mais dans les rétrécissements qui dépendent de l'atrophie, dans ceux qui résultent de la sclérose, je trouve seulement indiquée la dilatation, et je repousse comme

mentionnelles les autres méthodes de traitement. Comme ces cas sont les plus fréquents, et que par conséquent j'emploie la dilatation le plus souvent dans ma pratique, c'est à propos de cette méthode que je me suis livré à des études et à des considérations plus spéciales. Je répète encore une fois quel est le but principal de cet ouvrage, sur 100 rhéclatements, 99 au moins peuvent guérir par l'emploi des bougies en cire, etc. Mais la dilatation obtenue par ces moyens réclame relativement un temps trop long. Je prétends avoir trouvé d'autres moyens, qui tendent qu'ils sont suffisants comme les bougies en cire et qu'ils ne s'obligent pas la malade à abandonner ses occupations, pas même au seul jour, produisent une dilatation si prompte, et dans la plupart de cas en 8 ou 10 jours, elle est complète. Je passe maintenant tout ce qui a rapport aux diverses méthodes de traitement, car je me sentirais forcé de répéter ici ce que l'on trouve dans tout traité moderne. Je me limiterai à parler de la méthode de la dilatation, des instruments que j'emploie pour la pratiquer et des heureux résultats que j'en ai obtenus.

DE LA MÉTHODE PAR DILATATION

ET DES INSTRUMENTS DE L'AUTREUR

Je me suis demandé bien souvent pourquoi des praticiens éminents trouvaient aujourd'hui si fréquemment indiquée l'arthrotomie ? Est-ce là par hasard le seul résultat d'idées préconçues sur la nature de la maladie ? Je suis d'avis qu'aux nombreuses raisons de cette préférence, on peut ajouter les suivantes : la première et la plus importante, c'est que l'arthrotomie d'une opération difficile, dangereuse et pleine de hasards qu'elle était, est devenue, grâce aux perfectionnements que l'on a réalisés, une opération facile, méthodique et moins dangereuse. Il faut chercher l'autre raison dans le peu de progrès qu'a faits la dilatation ou compression de l'opération césarienne. Les deux procédés de dilatation : dilatation graduée, (temporaire ou permanente) et la dilatation brusque, forcée, présentent également des inconvénients. La dilatation brusque peut être comparée à l'arthrotomie interne telle qu'on la pratiquait il y a quelques années, c'est une opération difficile et dangereuse. L'autre procédé avec toutes ses lenteurs laisse le malade et le médecin, et si n'est pas rare de rencontrer des cas où après se

long temps on ne s'est forcé de l'abandonner. Je me suis souvent posé cette question : si l'utilitarisme interne est devenue une opinion plus réfléchie et plus répandue, grâce aux améliorations qui lui ont apportées les efforts des chirurgiens modernes, ne pourrait-il pas en être de même pour la dilatacion ? Les inconvénients de la dilatacion sont en résumé : 1° la longueur du traitement, 2° les difficultés que l'on rencontre, surtout dans les premiers jours, 3° l'insuccès dans quelques cas. Comment faire disparaître ou au moins diminuer ces inconvénients ? C'est là le problème que je me suis proposé de résoudre. J'ai voulu d'abord voir ce que l'on pouvait faire avec les instruments ordinaires que tout le monde emploie, j'ai ensuite inventé et employé des instruments spéciaux que je crois nécessaire de décrire tout d'abord. La difficulté de franchir un rétroissement pendant les premières séances, a fait sentir la nécessité de fabriquer des bougies de matière et de forme diverses. Comme dans ces circonstances nous devons recourir à des instruments tels fins, ceux que nous avons entre les mains ou sont trop flexibles et ils ne peuvent être guidés convenablement, ou sont trop rigides et ils deviennent dangereux, nous pouvons toujours s'adapter à la direction du rétroissement. Les bougies en plomb m'ont été d'une incontestable utilité, mais on ne peut faire avec ce métal des instruments tels fins, de ce rétroissement peu et souvent jusqu'à se casser, si d'autre part on fait un alliage, par exemple de plomb et d'étain, la bougie devient trop résistante. Après quelques essais, je suis arrivé à faire des bougies métalliques, Pl. II fig. 1° qui ne laissent rien à désirer. Elles consistent en une tige en métal anglaise

ou en acier, longue d'environ 34 centimètres, dont une extrémité est munie d'une petite plaque, *b*, qui sert à tenir l'instrument entre les doigts et à rendre le toucher plus délicat. Cylindrique, *a* dans une longueur d'environ 15 cent; cette tige devient ensuite légèrement conique, pour se terminer par une extrémité très fine, *c*, qui n'est guère plus grosse qu'un cheveu, à trois centimètres de son bout vésical. La tige est revêtue d'une couche de plomb et passée à la filière, en sorte qu'elle représente une baguette, par exemple de n° 1 qui, presque indéchirable pendant 15 centimètres, commence à le devenir ensuite assez facilement et dont l'extrémité est convenablement flexible dans un parcours de 3 centimètres environ. [2] J'ai plusieurs numéros de ces sortes de baguettes. Je prétends qu'avec cet instrument, il est impossible de trouver un rétrécissement qu'on ne puisse franchir; de plus, dire que le point flexible a passé librement, le reste de la tige qui est presque droit, le suit naturellement, le rétrécissement est alors traversé par le point droit de l'instrument qui opère, malgré son exiguité, une dilatation beau-

[1] Après avoir essayé mon instrument à l'Andromée, Nov. 1886, j'ai modifié ses formes. Sur la tige cylindrique d'acier ou de métal anglais plus ou moins longue afin de tenir de l'instrument, j'ai ajouté une tige de même métal, plus ou moins longue, selon que ce métal est le plus convenable. Cette tige est conique et très fine à son extrémité libre. J'ai revêtu cette dernière d'un petit tige de plomb, pour le grossir, enrouler deux ou trois fois, et après avoir passé le moyen ou point de passage entre le sque et le métal anglais, j'ai passé à la filière l'instrument, pour que le plomb s'étende uniformément au fil de fer ou à son extrémité. J'ai ajouté une petite plaque, *b*, et après avoir réglé ou *a*, l'extrémité du fil de fer ou de l'instrument avec le tige de plomb. J'ai dressé l'instrument entier pour ne pas se blesser les mains et pour que la baguette puisse s'insérer au milieu plus de commodité qu'une baguette de fil.

comp plus énergique que si l'on s'était servi de simples bougies en cire. Cette amélioration ne pourrait cependant pas se valoir. Chaque fois qu'avec une de ces bougies capillaires j'étais arrivé jusqu'à la vésie, j'étais sûr qu'elle pût tout-à-coup grossir assez pour faire une dilatation de dedans en dehors et d'arriver au crant. Cette dilatation de dedans en dehors me semblait présenter de nombreux avantages. 1° la certitude d'être dans le bon sens et l'impossibilité d'en sortir; 2° la certitude d'agir sur la partie rétrécie du canal et non sur d'autres. Dans cet ordre d'idées, j'imaginai un premier dilateur dont je dirai ici quelques mots avant de décrire celui que j'emploie le plus souvent, parce qu'il peut être utile en quelques cas. La partie fondamentale de l'instrument consiste en trois fils d'argent pas, très fins, soudés ensemble par une arborescence légèrement évasée en forme d'olive. Ces trois fils grossis et appliqués les uns contre les autres, représentent une longue fine et flexible, que l'on introduit jusque dans la vésie. On prend ensuite une petite balle d'acier percée de trois trous et faite au bout d'un tige fine, également d'acier; on enfle les trois fils d'argent chacun dans un des trous de la petite balle, que l'on pousse jusque dans la vésie et que l'on y maintient avec le tige dont elle est munie. Les trois fils restent ainsi tendus et ne peuvent sortir pendant les manœuvres successives. Cette première petite balle a déjà produit une certaine dilatation, on en prend alors d'autres qui sont graduellement de plus en plus grosses, until les trois trous périphériques comme la première et doivent être enflés les fils d'argent, elle se présente un quatrième au centre

par où passent la tige d'acier qui manœuvre en place la première petite boule à l'extrémité viscérale de l'instrument. La plus petite de ces boules remplit aux trois quarts d'argent, et à la tige d'acier est soudée avec une petite canule qui passe par la tige d'acier jusqu'à ce qu'elle soit arrivée en contact de la première boule introduite. Cette canule est fendue dans toute sa longueur pour donner passage à une petite plaque soudée à l'extrémité libre de la tige d'acier qui sert à la tenir fixe. On passe successivement et de la même manière des boules de plus en plus grosses jusqu'au point d'obtenir une dilatation énergique.

J'ai encore fait autrefois usage d'un autre dilateur assez simple. Je place l'extrémité d'une bougie très grêle en corde à boyau sur une plaque de métal réfléchissante, afin qu'elle se gonfle; je la verse avec une lame de métal finie à la flamme d'une lampe à esprit, et la bougie ainsi préparée a une extensibilité différente des autres appropriée. On applique alors sur la bougie des grains de verre ou métalliques d'une grosseur graduée, de manière à occuper une ligne de 5 à 6 centi. et on les pousse au moyen d'une sonde jusqu'à l'extrémité viscérale de l'instrument. Ces grains en franchissant le rétrécissement font une dilatation graduelle très efficace; et la sonde après avoir passé le chapelet, vient buter contre le rétrécissement et augmenter l'effet déjà produit. On comprend facilement que rien n'empêche d'employer l'instrument tout aussi comme à P. II. fig. 3. On peut encore remplacer la bougie de corde à boyau par un fil métallique : (3) c'est ce que j'ai fait der-

(3) Les la quotes a fait-il fait avec la description de l'instrument,

extérieurement, comme on peut le voir dans la figure
 citée. Le cercle, *a*, est plus large dans son profil,
 et aboutit une vis terminée en bouton, *b*. L'extrémité
 interne de cette vis est creusée d'un cô, qui a une vis
 à pression, la quelle sert avec ses boutons hors de
 la cercle par une fente longitudinale. Un gros fil
 de cuivre, serré et très fin dans une de ses extré-
 mités, traverse l'instrument entier de *a* à *c*. Deux ou
 parties conques, *d*, sont enfilées au certain nombre
 de grains métalliques gradués en forme de pyramide,
 V: fig. 3. Chaque grain a sa base proportionnée à
 la portion de fil qu'il occupe, et il est creusé pour
 recevoir une partie du grain qui se trouve au dessous.
 Le dernier grain, *e*, est soudé au fil de cuivre, qui
 est fixé à son autre extrémité avec la vis à pression.
 En tournant la vis en dehors, *e*, le fil de cuivre se
 tend davantage, et alors tous les grains s'enchâs-
 sent fortement l'un sur l'autre: au contraire en ra-
 lecissant la vis, les grains s'articulent librement.
 Dans ce cas la sensibilité de l'instrument est égale
 à celle du fil de cuivre recuit, c'est à dire comme
 la cire: tandis que quand le fil est en tension forte
 et les grains étroitement enchaînés, l'instrument
 acquiert une rigidité presque inflexible. L'opérateur
 a donc entre les mains un instrument, qui, à volonté
 et dans les divers moments de l'acoolation, est
 flexible comme la cire, ou inflexible comme une sonde
 d'argent. Les grains en franchissant le rétroces-

sement que le voit devant P. H. fig. 4. n'est pas cette raison je dis-
 pète, que le mouvement ne s'est pas arrêté sur cet instrument. Re-
 vient je ne vois après de cette observation, même en je compare
 les premières espèces d'instruments.

ment fait une dilatation graduelle; par conséquent, si l'on peut porter l'instrument dans la racine des la première séance, on a immédiatement une dilatation égale au N° 8. Dans les séances suivantes, on peut décaler l'instrument, et changer quelques grains contre d'autres plus gros, et de cette manière, obtenir en 2 ou 3 séances une dilatation n° 12 à 15. Arrivé à ce point, on peut couler le reste du traitement au malade lui-même avec les grosses bougies en cire (1). J'ai voulu dire deux mots de ces instruments

(1) Pour valifier l'utilité de cet instrument, je veux en parler un peu de plus personnel que de cette observation suivante. Le docteur B. de Berlin, l'un des témoins et disciples dans un des Mandataires, confesse depuis longtemps de reconnaissance de l'utilité d'un plusieurs Mandataires de longue durée qui ont instrumenté ce patient. Quelques temps après, il écrivait que le patient lui-même était plus petit, devenait silencieux, et qu'il lui avait tous les symptômes des instruments existants, sans compter l'écoulement qui se faisait en temps de traitement. Le 15 mars dernier, j'ai entretenu le docteur B. Pour exprimer l'utilité de ces instruments, je commençai la première séance avec les bougies ordinaires au n° 8, dissolvant, etc. Dans M. B. avant, j'ai appliqué à la première séance ces bougies jusqu'à la plus petite, mais sans pouvoir rentrer à ce diamètre même dans le rectum. Le rétrécissement se trouvait dans la partie inférieure du rectum. Après une destruction d'unités croûtes, j'ai réussi à rentrer le malade. Le matin du 16, j'ai appliqué le dilateur n° 12 B. et après avoir un peu travaillé sur le rétrécissement, comme on devait avec une lime, et ainsi le soir. Je l'ai posé jusqu'à dans le matin. J'ai levé l'instrument au plus tardant 10 minutes, et j'ai vu la dilatation de voir au point d'être presque normal. Je puis assurer que le malade souffrait car il ne pouvait plus de continuer avec cet instrument, qu'il n'a le temps de voir le Mandataire. J'ai vu de plus petit le l'instrument, et je l'ai retiré avec le plus grande facilité d'un à l'autre, en changeant avec une dilatation égale au n° 14. Je me suis vu pendant quelques jours de grosses bougies en cire, et le malade, qui ne était pas même capable de sentir par un Mandataire continué de

Craze

8

parce qu'il m'a été de quelque utilité, mais j'étais loin avec eux d'avoir résolu le problème que je m'étais posé. Le filin bouge en plomb qui a sur tous les autres instruments l'avantage de franchir facilement les rétrécissements devait acquiescer, une fois dans la vessie, au volume assez considérable pour opérer en la retirant une dilatation efficace. Le problème fut complètement résolu au moyen de l'instrument que je vais décrire. Pl. II. Fig. 2. Il est flexible à son extrémité, b, d., comme une bougie en plomb. Il est composé d'une canule d'argent des plus minces de 14 cent. de longueur qui se prolonge par une tige canulée très fine, également d'argent, et longue de 18 centim. b, d., cette dernière partie de l'instrument est très flexible, et cette flexibilité dépend de la manière dont la tige est construite. Elle est faite d'une feuille d'argent sur laquelle sont enroulés deux fils d'argent parallèles qui forment avec elle la manœuvre. Un troisième fil d'argent libre se cache dans la manœuvre et parcourt l'instrument dans toute sa longueur. Ce troisième fil d'argent est fixé par ses deux bouts aux deux extrémités de l'instrument de la manière suivante: l'extrémité rétractile de l'instrument tient par une petite vis sur laquelle est vissé une petite boule qui représente l'extrémité rétractile des bougies sondes. La manœuvre se prolonge sur la vis dont elle échappe la petite; on y cache le bout du fil replié

on retire cette opération. J'ai vu l'écoulement de la urine le 16 juin, et j'ai repris avec plaisir qu'il continuait à se passer parfaitement et qu'il n'intervenait dans les quatre jours une bougie et 15 sans aucune difficulté.

en crochet; et on l'y fixe en venant le bouton terminal. On peut encore faire d'une autre façon l'instrument se termine par un très petit doreau qui s'insère à quelques pas de vis. Le fil se termine comme une tête ronde de vis et s'immédiatement au-dessus quelques pas de vis aussi. On introduit le fil dans l'instrument, et pour le tirer, il suffit de le passer sur le petit doreau. D'une manière encore plus simple, mais moins artistique, on peut passer le fil directement sur l'instrument. L'extrémité libre de la canule, *a*, est un peu plus grosse; elle est munie intérieurement à son orifice de quelques pas de vis. Cette partie d'une longueur de 2 centimètres s'introduit les deux anneaux des sondes ordinaires et présente entre eux une fente longitudinale. À l'intérieur, elle reçoit une vis d'un centimètre de longueur qui à une extrémité est munie d'un petit volant, *b*. L'autre est vissée à un petit cylindre qui peut tourner sur son axe tandis que la vis reste immobile et réciproquement. Ce petit cylindre est vissé latéralement d'un trou par où passe une vis à pression. Le cylindre et la vis sont percés à leur axe, et reçoivent le bout du fil d'argent qui se trouve fixé et tendu par la vis de pression dans le petit cylindre. La charnière de la vis à pression s'engage dans la fente perçue à la canule et peut la parcourir. Supposons que la vis soit entièrement cachée dans la canule et que le fil ait été fixé et tendu dans une tension complète, en tournant le volant, la vis s'éloigne de la canule, et le fil d'argent s'en éloigne également, tout en ne subissant aucune torsion, dès qu'il est sur le cylindre. Une fois sorti de la canule, il tire sur l'extrémité résécable du dilateur, en l'allongeant de côté et de se courber en forme

d'un fil, le fig. 2^e dont le fil représente la corde, a. Si l'on fait entrer la vis, le fil reprend la position qu'il avait auparavant dans la corde. Si l'on jette un coup d'œil superficiel sur cet instrument, on croit tout d'abord que cet arc n'a pas besoin de force pour dilater un rétrécissement; mais il faut se représenter la manière dont il agit, et alors encore il faut l'examiner après qu'il a été extrait d'un arêtre affecté de rétrécissement. En effet, à mesure qu'on retire l'instrument, l'arc commence à s'engager dans le rétrécissement, le fil rentre dans la rainure, au même temps l'arc devient plus petit et gagne en proportion une plus grande étendue, d'autre un moment où ce n'est plus qu'un tout petit arc, mais il n'en est que plus résistant. On peut juger du degré de dilatation suivant la plus ou moins de force que l'on a imprimée à la vis. De deux choses l'une, ou l'instrument sortira facilement, ou bien il vous faudra employer beaucoup de force. Êtes-vous partisan de la dilatation forcée? ah bien! bien, car vous êtes sûr de ne pas dévier de la bonne voie. Vous ne voulez pas en contraire employer une grande force, retirez un peu la vis et tirez modérément et lentement; et quand l'instrument sera dehors, vous serez toujours sûr d'une dilatation bien plus grande que si l'instrument n'avait été qu'un simple bougie. Si la dilatation n'a pas été complète après la première séance, il en faudra encore un bien petit nombre pour y arriver. Quels peuvent être les inconvénients que l'on peut attribuer à cet instrument? Assurément aucun dans son introduction; il entre comme une bougie en vis. Je ne prétends pas qu'on puisse franchir d'un seul coup tout rétrécissement ou moyen

de mon dilatateur; mais je déclare franchement que si, au passage les autres bougies, qu'elle s'écrit en creux ou en creux à boyau, etc, passent également bien, mon dilatateur On pourrait proposer d'ajouter à mon instrument une petite bougie différencée, un moyen d'un ajoutage à vis comme cela se fait pour tous les instruments modernes. Sans doute cela ne présente aucune difficulté, parceque la vis même de la bougie se vint sur l'extrémité de mon instrument et vient de plus y fixer le fil d'argent. Mais je ne vois pas un grand avantage à cela. Je puis attendre que jusqu'à présent, quand je n'ai pu réussir à francher un rétrécissement insurmontable avec mon instrument, il m'a été également impossible de le franchir avec ces bougies différencées; et qu'au contraire quand j'ai pu traverser les rétrécissements les plus graves avec ces bougies, il m'a été également doué de le faire avec mon dilatateur.

Dans son extraction, il peut présenter quelques inconvénients qui sont le fait soit de la personne qui s'en sert, soit de l'instrument lui-même. On peut le retirer en employant une grande violence, et avec toutes alors tous les dangers d'une dilatation forcée. Mais on peut éviter la vis autant qu'il faut pour extraire une force modérée il vaut beaucoup mieux ramener sur un certain degré de tension continue que d'employer une grande force; il en sera ainsi comme pour l'application du forceps ou pour le dernier temps de la taille: les organes tendus avec douceur résistent peu à peu. On objectera que le dilatateur décrit n'a pas une forme cylindrique et que ne présentant qu'un seul diamètre, il ne dilate qu'un seul diamètre. C'est là, à mon avis, une objection bien faible. Admettons néanmoins que la dilatation ne s'effectue

par un fillement sur tous les points du rétrécissement, il suffit d'obtenir une dilatation suffisante pour donner passage à une corde ordinaire dont l'action sera de calmer l'arête. On pourra encore faire observer que si l'on veut faire rentrer le fil dans la sonde, il ne pourra venir s'y replacer, parce que, entre lui et l'instrument, la membrane saignée de l'arête sera venue s'interposer. Je me permets de répondre que l'instrument a déjà pris une forme courbe, que le fil reprend à la concavité, qu'il forme la corde de l'arc et que par conséquent il soulève le paroi urétrale supérieure; et qu'on se défendait, il la précède dans la sonde. D'ailleurs, j'ai appliqué l'instrument un grand nombre de fois non-seulement sur des arêtes effectives de rétrécissements, mais encore sur des arêtes à l'état sain, et jamais je n'ai éprouvé la moindre difficulté à replacer le fil dans la sonde. L'instrument produit la dilatation lorsqu'on le retire de dedans en dehors; la membrane saignée ne vient-elle pas s'interposer entre l'arc et la corde; et, à mesure que l'on retire le dilateur, ne voit-elle pas passer par l'angle postérieur fermé par le fil et la sonde? Ne nous exposons-nous pas à la déchirer, à l'arracher? S'il en était ainsi, en retirant l'instrument ouvert à travers un arête à l'état sain, on devrait éprouver quelque obstacle. Il en est tout autrement; car on retire le dilateur ouvert avec la même facilité que si c'était une corde ordinaire, et sans que l'individu ressentît la moindre douleur, ce que je puis garantir en toute connaissance de cause, puisque je l'ai essayé sur moi-même et sur beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs la sonde passe par l'instrument, lors de son

extinction, n'est pas certainement celle d'un œil; il ressemble presque à un œil avec une extériorité très saillante, et l'anneau très étendu et large, formé en grande partie par la bague d'argent, cette extériorité est placée postérieurement. on peut la comparer à un œil volumineux de ponde. De plus la membrane muqueuse est très mince, elle adhère intimement à la paroi; et elle est liée en même temps que l'artère par le dilatateur, sans faire des plis qui pourraient être pliés par l'anneau. Assurément si un polype existait dans l'artère, l'anneau de l'instrument pourrait l'accrocher et le déchirer; et j'espère qu'on pourra utiliser mon instrument dans ce cas de l'artère et dans d'autres cavités difficiles à traverser. Enfin on pourra m'objecter que le fil entre dans les chairs, et que ce dilatateur n'est au fond qu'un arthrostome. Sans doute si vous plaiez un fil très mince, par exemple un fil de platine, il couperait là où l'instrument trouverait un obstacle à passer, et vous auriez alors un excellent arthrostome puisqu'il présenterait sur les tumeurs l'avantage d'une introduction beaucoup plus facile; de plus, si incisions d'artères ou avant sans crainte de diviser de droit chairs, et n'encourra que le rétrécissement; le fil, quelque fin qu'on le suppose, n'agira que comme un bistouri à lame ronde et grosse, et, pour employer une expression triviale, il fera une incision sèche. Mais est-il possible qu'un gros fil d'argent puisse traver les chairs? il faudrait pour le mener employer une grande force, et le chirurgien aura toujours la faculté d'agir autrement, puisqu'il peut à volonté dissocier le vais, s'il éprouve trop de résistance. Enfin je ferai remarquer que ce n'est pas tant par le fil qui permet la ligne droite, que l'in-

strument dilata, mais bien plutôt par la petite et forte courbe de la langue qui se trouve en dehors de l'axe de l'instrument et portant en dehors de celui de l'urètre. En admettant que l'on veuille transformer le dilataleur en un aréthrotoque, on pourrait l'acquer de faire porter l'incision sur la paroi supérieure de l'urètre. Sans leur compte que tous des aréthrotoques coupent dans une seule direction déterminée, est-il plus rationnel de faire porter l'incision sur la paroi postérieure ou inférieure, comme on voudra l'appeler, ainsi que le font la plupart des aréthrotoques ? s'il s'agit de la portion prostatique je n'hésiterais pas à choisir l'ancien postérieur ; mais sur la portion membraneuse et la spongieuse, l'incision de la paroi supérieure est bien possible. N'est-ce pas précisément sur ces deux portions que l'on pratique plus volontiers l'aréthrotoque, à tel point que quelques praticiens se refusent à admettre l'opportunité sur la paroi prostatique ? Il y aura donc un avantage réel à avoir la lame de l'aréthrotoque qui coupe supérieurement. Ainsi, même à ce point de vue, cet instrument présente un progrès sur les autres. J'ai voulu examiner brièvement ces quelques objections, que peut soulever un examen superficiel de mon instrument pour montrer qu'elles sont sans valeur. Je n'ai pourtant pas eu l'intention de faire l'éloge de mon dilataleur qui, s'il présente quelque mérite, aura bien le pouvoir entre les mains des chirurgiens. Néanmoins, les faits que je vais exposer, sont par eux-mêmes de la plus haute importance.

Première observation

Joseph Balvi de Florence a été reçu dans les salles de la clinique chirurgicale, le 18 novembre 1895. C'est un individu de 48 ans, d'un tempérament lymphatique nerveux, portant les traces du molasse. Il raconte avoir joui en général d'une bonne santé et avoir mené une vie régulière. Néanmoins son état de célibataire lui avait procuré quelques blessures dans les combats de Vénus. Dans sa jeunesse, il avait souffert plusieurs hémorrhagies de longue durée qu'il s'était bien gardé de traiter, parce que dans sa pathologie à lui, il fallait laisser libre cours à la maladie pour ne pas s'exposer à la virgule. Notre malade guéri, il se passa à ce à son, sans qu'il s'aperçût de la moindre incommodité dans le canal de l'urètre. Très méfieux sur sa santé, il avouait, que pendant tout ce temps, le jet de l'urine avait toujours été gros, qu'il s'échappait avec force et rapidité et faisait la parabole ordinaire. Ce n'est qu'après ces quelques années, et sans cause appréciable, que le malade commença à éprouver quelques difficultés dans la miction; le jet n'était pas encore plus petit, mais il sortait avec moins de rapidité, ce qui obligeait le malade à mettre plus de temps pour uriner, après quoi, il avait encore quelques gouttes. L'inconfort est un peu revenu ainsi que la courbe, à partir de ce moment, on rencontre une suite de symptômes qui auparavant n'avaient jamais été remarqués par le malade. Ainsi, en remontant jusqu'à la hémorrhagie, nous avons

deux périodes diverses et bien distinctes : à la première, appartenant les symptômes qui représentent directement l'inflammation, à la seconde, ceux qui découlent d'un obstacle à la libre émission de l'urine. Ce cas, loin d'être exceptionnel, est des plus ordinaires et peut servir de type pour une description détaillée. En apprenant que notre malade commençait à gonfler le ventre, il n'est plus un jour de bien être complet. Peu à peu, le jet de l'urine devient plus fin, moins fort, il s'échappait parfois en arroyons. Pour éviter les pénibles gouttes d'urine il lui fallait faire des efforts, les crises étaient plus fréquentes, l'urètre était le siège de constantes douleurs, le besoin d'uriner ne pouvait être satisfait de suite, et après avoir fait des efforts répétés et pris diverses positions, il venait que l'urine descendait le long de l'urètre jusqu'à un certain point où elle s'arrêtait; elle tombait goutte à goutte, et cessait par un jet fin et intermittent. Le malade n'était arrivé à cet état de strangurie que quatre ou après les premiers symptômes de rétrocession et il nous appela les hémorrhoides. Durant tout ce temps, il n'avait cessé de se agiter, redoutant de perforation, et si il ne s'était pas adressé à une personne de l'art, c'est qu'il ne croyait pas à la guérison.

Mais arrivé au point de ne pouvoir plus uriner, il était entré à l'hôpital, en proie aux angoisses de l'ischurie. Le vésicule dépassait l'épigastre de plus de quatre travers de doigt. On administrait ce malade les saignées les plus ordinaires en pareille circonstance, bain entier, applications de sangsues, saignées, potages et lavements émollients. Quel l'ischurie est en grande partie sous l'influence de l'élément spasmodique, j'ai

beaucoup à ma lueur de demi-lumière contenait une forte dose d'au distillé de l'urine et de d'opium. Mais dans le cas présent, tous ces moyens n'eurent d'autre effet que de diminuer la fréquence et l'intensité des efforts pour uriner. Nous tirons au commencement de l'après-midi, et le Prof. Borel qui venait de reprendre la clinique, après avoir montré aux élèves la nécessité de recourir aux moyens chirurgicaux, prit l'assurance d'abord qu'il existait un étranglement au commencement et de l'urètre membraneux; il essaya de le franchir, mais inutilement avec des bougies en oro, en passant distales et en sorte à boyau; et après une longue séance, il recommanda d'insister sur les moyens précédents de venir le malade dans l'après-midi: les souffrances étaient à leur comble. J'introduisis alors le plus délicatement possible un petit bougie de plomb jusqu'au point où, jadis, que je parvins à franchir, mais à une courte distance; environ à un centimètre du premier, j'en rencontrai un second bien plus fort et plus difficile à traverser, néanmoins, je pus le franchir, et il me fut alors facile de porter l'instrument jusqu'à dans la vessie. Après quelques minutes, je le retirai et le malade put émettre, avec un jet très fin, une certaine quantité d'urine. Il fut ensuite possible au malade d'uriner lui-même encore deux fois en éprouvant le plus grand soulagement. Mais dans la soirée, les bons effets produits par l'introduction de la bougie s'évanouirent, et le malade fut de nouveau en proie à tous ses tourments. Le lendemain matin, la vessie s'était élevée jusqu'au niveau de l'ombilic; le malade était dans un état de prostration profonde, la température abaissée, le pouls lent et petit, la physionomie dé-

composés. Le Prof. Barro explique aux élèves la nécessité urgente de prendre un parti énergique, dit-on, recevoir même à la position de la vessie. Parmi les moyens à employer, il mettrait en premier lieu l'application de sons distendus, parce qu'il lui paraissait, et non le moyen le plus sûr pour vider la vessie, et même le moins dangereux; et il m'invitant à l'appliquer moi-même en présence des élèves.

Je réalisai rapidement bien m'assurant avec la bougie en plomb, « nous étions dans les mêmes conditions que la soirée précédente. Dans le cas contraire, j'étais décidé à me servir de l'anesthésie. Je conduisis le dilatateur jusqu'à dans la vessie sans trouver de plus grandes difficultés que pour la bougie de plomb. Après avoir jaugé par la portion de vis qui était sortie, que l'instrument était suffisamment ouvert pour obtenir une dilatation convenable, je commençai à retirer l'instrument d'une manière lente et graduelle. Il coula du sang à peine deux gouttes de sang, la même quantité et peut-être encore moins que celle qui s'était écoulée le jour précédent avec les bougies; et le malade déclara qu'il avait encore moins souffert. Je puis alors passer avec la plus grande facilité une sonde, de genre distique, de N° 18, et la vessie fut immédiatement vidée. La sonde fut tenue, à demeure; l'urine dès le premier jour devint limpide; le malade prit du bouillon et quelques aliments solides, et passa une nuit tranquille. Dans l'après-midi du lendemain, je lui mis une sonde de N° 18 qu'il tint pendant une semaine. Après quoi, on introduisit chaque matin une grosse bougie, comme il est prescrit à toute personne qui a obtenu une dilatation complète avec le procédé ordinaire; et pour bien suivre les effets de ce nouveau

procédé de dilatation, je refusa le malade dans le clinique jusqu'aux premiers jours du mois de janvier suivant.

Seconde observation

Laurent Laceroni, de Florence, âgé de 34 ans, tempérament lymphatique, fut reçu à la clinique le 3 Janvier 1887, affecté depuis longtemps de duréon. À l'âge de 25 ans, il avait eu une gonorrhée chronique qu'il n'avait point traitée. Il avait parfois ressenti de la difficulté à uriner et une sensation de cuisson vers le bulbe uréthral, avec des douleurs pour uriner quelques fois la nuit. La durée qu'il eut d'abord n'avait été que momentanée, avait pris depuis une ample et constante permanence, et était allée peu à peu en augmentant. Nous retrouvons ici les deux périodes notées chez le précédent malade, dans le premier, la durée était évidemment sous la dépendance de spasme; dans le second, sous celle d'une stricture, même la de canal. L'exploration directe permit découvrir un obstacle au passage d'un instrument quel qu'il fût à l'orifice antérieur de l'urètre membraneux; il n'était pourtant pas difficile de faire uriner jusqu'aux dernières gouttes une baguette en cuir n° 4. En présence des élèves, je passai avec la même facilité le dilatateur et j'opérai la dilatation, aussitôt après, j'introduisis une sonde en gomme élastique de n° 10, la lendemain, j'en mis une autre de n° 18, et après l'avoir tenue huit jours à demeure, je permis au malade de s'en retirer chez lui, après les recommandations comme et il devait se conduire pendant quelque temps encore.

Troisième observation

Ce cas a été pour moi, d'un grand intérêt, car il m'a procuré l'opportunité de faire des considérations cliniques sur la forme la plus commune des rétrocessions mémoires anciennes, où l'on rencontre facilement associés les divers éléments morbides, que j'ai étudiés comme producteurs de cette maladie. Rodolphe Dollfus de Paloue, âgé de 40 ans, d'un tempérament nerveux, fut reçu à la clinique le 16 Janvier 1867. Dans sa jeunesse, il avait eu plusieurs mariages; de temps en temps il avait souffert de diarrée de forme spasmodique, même en dehors des époques d'accès de l'asthme. Quelques années après, il entra dans cette seconde période dont nous avons déjà parlé plusieurs fois; la diarrée devint permanente et progressive; il souffrit de l'asthme une sériection particulière sous forme de quintes métriques; les souffrances arrivaient peu à peu jusqu'à la strangurie permanente et à l'ischurie intermittente. Il eut des métristes et des plus habiles dans les opérations sur les voies urinaires, l'avaient examiné et aucun n'avait pu réussir à franchir l'obstacle qui existait vers le milieu de la portion spongieuse. Mais même je le vois aux d'êtres qu'une grosse ancre s'arrêtait à 8 centimètres du métr. On donnait bien ce point avec la palpation; l'on se sentait sauter épauleusement de la paroi, on appréciait au contraire tout bon que la périphtérie externe de l'urètre n'était rétrécie en ce point. Ce n'est pas à un fait nouveau; je dirai même

qu'au laboratoire fréquemment. Je pris des instruments divers de forme, de dimension et de matière, mais aucun d'eux ne put franchir l'obstacle, à l'exception d'un de mes bougies métalliques, le n° 3. Après avoir librement passé au de là l'instrument environ trois centimètres, je rencontrai un autre obstacle. À ce point, la difficulté fut insurmontable. Je ne m'obstinaï pas à la vaincre, car une propre expérience m'e suggéra en pareils cas de partir d'abord le premier rétrécissement jusqu'à une certaine dilatation pour attaquer ensuite le second avec plus de facilité. Apparemment, j'avais l'habitude, mais sans, de vouloir arriver de suite dans la veine, je perdais ainsi beaucoup de temps avant de pouvoir y arriver avec une bougie des plus fines, et il m'arrivait quelquefois de ne pouvoir plus passer l'instrument le lendemain; et, en attendant, le malade se décourageait et le traitement se prolongeait indéfiniment. Mais après avoir pris la détermination de ne m'occuper du second rétrécissement qu'après avoir préalablement dilaté le premier, j'ai pu me convaincre que cette manière de procéder dans le traitement offrait de grands avantages: car tandis qu'il semble qu'on doive ainsi l'allonger, on le raccourcit au contraire au de là de toute espérance. J'introduisis donc mes dilateurs jusqu'au second rétrécissement, et je fis la dilatation du premier qui était très résistante, ce qui m'obligea à employer assez de force. Quelques gouttes de sang s'écoulaient du méat, et dès de plus. Je maintins ce degré de dilatation en passant plusieurs fois par jour des bougies en gomme élastique. Quelques jours après, je pus traverser le second rétrécissement avec une de mes bougies mé-

tailleuse n° 3 que je portai jusqu' dans le vœde. Après quoi, d'autres bougies en cire et en gomme élastique pénétrèrent facilement, et la dilatation totale de l'urèthre était mesurée par une sonde de n° 18. Peut-être aurais-je pu dans une seule séance avec mon instrument obtenir une dilatation complète, lorsque tout-à-coup le malade fut pris de la toux et, en l'attachant à son lit par à l'hôpital, il en sortit volontairement le 5 février.

Parce les nombreux cas de strictures dont j'ai appliqué mes dilateurs, j'en ai observé trois qui se sont présentés à la clinique, parce que j'ai pu les traiter en présence des élèves et de mes confrères. Je ne parle pas des autres cas que m'a fournis la pratique en ville, quoiqu' ils m'aient donné de brillants résultats; ce serait m'engager dans une description longue et monotone. Je ne puis pourtant passer sous silence quelques-uns d'entre eux, vu qu'ils me semblent très-importants.

Quatrième observation

M^r Pierre Scott, de 48 ans, tempérament lymphatique nerveux, employé à la Commune, après avoir souffert des hémorrhagies prolongées dans sa jeunesse, commença en urinant à éprouver des difficultés qui augmentèrent graduellement jusqu'à produire la rétention et l'ischurie. Après 15 ans de souffrances, il en arriva à être réduit à uriner goutte à goutte et non sans de grands efforts, à tel point qu'il avait un besoin presque continu

d'arriver. Pendant l'été de 1866, il se débatait au péril d'un abcès méningé qui le força à résigner mes soins. À ma prochaine visite, j'eussais l'abcès et je lui donnai le conseil de se soumettre sans retard à un traitement par dilatacion, ce que le malade ne put faire, à cause de son sommeil. Il s'établit une fistule urinaire; et ce ne fut que quelques mois après, en octobre, que le malade se soumit au traitement. Par l'examen direct de l'urètre, je rencontrai sur la lésion postérieure de la fosse naviculaire un premier rétrécissement, et un second sur l'isthme antérieur de l'urètre membraneux. Comme je l'ai déjà dit, dans des cas semblables, je m'occupe d'abord de pousser rétrogradement, sans perdre de temps à aller à la recherche des autres. Dans le cas présent, le premier rétrécissement s'écroula que deux séances, séparées par un jour de repos; et, au moyen de bougies graduées, je portai la dilatacion jusqu'en n° 11; car je ne crains pas de le forcer un peu dans cette première portion de l'urètre. À la 3^e séance, j'arrivai facilement sur le second rétrécissement que je franchis avec une bougie fine, puis après un parcours d'urètre. Ici cessé, c'est-à-dire vers le milieu de l'urètre membraneux, je rencontrai un troisième rétrécissement beaucoup plus fort que les précédents. Arrivé à ce point, aucune bougie ne pouvait plus avancer; je réussis pourtant à franchir l'obstacle avec une de mes bougies métalliques des plus fines. Je la retirai quelques minutes après, et l'urine vint à couler à jet. Dans la journée, il y eut un accès de fièvre uréthrale. Deux jours après, ayant eu soin de faire prendre auparavant une dose de sulfate de quinine, j'introduisis de nouveau la

même bouge, et l'écoule se renouvelle. Le caillot fait se reproduire après une troisième séance, et je me décide alors à appliquer mon dilatateur. C'était pour la première fois que je faisais cette application, mais états-je resté quelque temps dans l'hésitation, car ce cas ne me semblait pas des plus propices pour soumettre à l'épreuve un instrument nouveau. J'introduisis très doucement l'instrument dans le vagin, comme j'avais fait les jours précédents pour la bougie; j'ouvris le dilatateur, mais pour que le vis sortît de 3 m. m., et je le retirai très lentement. Sans doute je dus employer une certaine force pour l'entraine, mais à ma grande surprise, le malade ne sentit aucune douleur et il ne s'écoula pas même une goutte de sang. J'eus alors un air d'être obtenu sans effort et la femme prise par l'instrument ne m'eût montré qu'il devait s'être produit une notable dilatation. Je voulus alors passer une sonde élastique n° 18, sortie de son emballage, pour m'assurer de la dilatation effectuée, et parce que je crois cette pratique utile, on le tenta quelques jours à demeure pour calibrer l'utérus et corroborer l'effet produit par la dilatation. Le malade qui jusqu'alors ne s'était aperçu de rien, cherchait à me convaincre que cette sonde ne pourrait passer en aucune manière; elle entra en contraire comme une épée dans son fourreau. J'aurais pu passer une sonde n° 20 et 22, mais devant la tenir à demeure, je choisis un n° inférieur. Le malade n'éprouva aucun trouble; le 2^e jour, je lui fis une sonde n° 22, que je laissai en place 4 ou 5 jours. Depuis lors, le traitement fut des plus simples. Le malade s'introduisait lui-même le même sonde n° 22 chaque matin; il revenait à ses occupations et ab-

servait en définitive les mêmes précautions que l'on conseille à qui a subi un traitement par dilatation. Depuis lors, quatre ans sont écoulés et le malade n'a plus rien éprouvé dans les voies urinaires.

Cinquième observation

Le Chevalier L. M. . . employé dans un ministère, d'une forte complexion, tempérament veineux, âgé de 38 ans, était affecté depuis près de 15 ans de rétrécissements de l'urètre qui avaient résisté aux soins de traitement par dilatation pratiqués ailleurs. Depuis trois ans, il était affecté de strangurie, tant au moment des voids volés et réguliers, il était obligé de s'introduire, chaque fois qu'il voulait uriner, une bougie des plus minces en gomme élastique ou en corde à boyau; et, en la retirant, il retirait par un jet mince comme un cheveu. Un jour qu'en raison de ses fonctions, le Chevalier M. . . dut rester trois heures sur pied, il ne put plus introduire dans la vessie la bougie mince dont il se servait habituellement. Je fus alors appelé pour la première fois; j'employai sur le moment les moyens ordinaires qui donnèrent au peu de calme au malade et permirent à la bougie de passer. Le cinquième jour, le malade était revenu à son état habituel. J'essayai d'introduire le dilateur, que je pus porter jusqu'à dans la vessie. Le rétrécissement était situé sur le commencement de la portion membraneuse. Je retirai l'instrument ouvert; et je mis à sa place une sonde élastique n° 18. 25 décembre, et

Fun

écoulement de sang, aucun écoulement pendant tout le reste de la journée. Le lendemain, je passai une sonde n° 10, que je laissai en place durant 6 jours. Depuis, lors le Chev. M. . . se trouve parfaitement guéri; il n'a plus ressenti aucun trouble dans les voies urinaires, il s'introduit dans le canal par pure pression, de temps à autre, une sonde du n° 12.

Sixième et Septième observations.

Je cite encore ici deux observations, parce qu'elles ont rapport à deux cas où les effets du dilateur ne se manifestèrent pas immédiatement, mais dans le suite. Le D. Cargotta traitant depuis années 6 avec un individu affecté de rétrécissement, et il n'eut jamais pu parvenir à passer une sonde d'un calibre supérieure au n° 6. Il me fit appeler en consultation pour appliquer mon dilateur; j'essayai de l'introduire, mais je ne pusais arriver à l'introduire jusqu'à dans le vésic. Le malade souffrait et pleurait à l'excès. Je proposai la chloroformisation, qui fut rejetée par le malade. Je pense que dans les cas où il est difficile d'introduire l'instrument, l'anesthésie doit être d'un immense avantage; mais chez nous on rencontre une grande répugnance à se soumettre à ce moyen si efficace. Enfin, après de nombreuses essais, je pus franchir le rétrécissement, et porter le dilateur dans le vésic. Le rétrécissement se trouva à l'origine du Forcèbre prostaticque. J'aurai l'instrument, je le retire lentement et je remarque par la forme qu'il a prise, qu'il s'est produit

une dilatation suffisante. Je veux alors porter une sonde élastique dans le rectum, mais la sonde ne passe pas. Toutefois le malade urine beaucoup mieux et n'éprouve aucun étranglement dans le courant de la journée. Le lendemain le D. Grigotti put porter dans le rectum des bougies de plus en plus grosses, et au bout de 15 jours, la dilatation était complète.

Pour l'occurrence de rencontrer un fait semblable dans un des services de notre hôpital de St. Marie Majeur. Il y avait depuis 18 mois dans ce service un malade souffrant d'un rétrécissement des plus graves, situé à la partie postérieure de l'artère membraneuse. Durant ce long espace de temps, il avait été traité par deux chirurgiens qui s'étaient succédé dans le service; et bien réellement on avait pu franchir le rétrécissement avec les plus fines bougies livrées par le D. Trezzani, qui était alors à la tête du service, à appliquer son dilateur, j'en fis l'introduction, non sans rencontrer de graves difficultés. Après l'avoir retiré avec, je pus constater que la dilatation avait été assez grande. Mais pourtant je ne pus également dans ce cas, porter une sonde dans le rectum. Néanmoins l'urine coula de suite plus facilement, et quelques jours après, le chirurgien de service put introduire de grosses bougies, et la guérison fut complète. Je me souviens qu'en réfléchissant l'occurrence de ne pouvoir dans quelques cas introduire une sonde dans le rectum, en employant l'anesthésie pendant la séance de dilatation.

NOTE. — Les 50^{es} qui mesurent le degré de dilatation, ne correspondent généralement à la même dilatation obtenue par 5^e de dilatation.

APPENDICE

Sur un nouveau procédé opératoire pour la taille des flegmons.

Les considérations anatomiques et cliniques dont j'ai fait mention dans le premier paragraphe de ce travail, me portaient à penser que la taille latérale, tout en étant employée de préférence, n'était pourtant pas tout à fait exempte d'inconvénients. Or, bien des maîtres de chirurgiens, et non des moins illustres, ont imaginé, conseillé et exécuté la taille de bien d'autres façons. Je pourrais citer tous les dévoués et tous les partisans de la taille médiane, ceux de la taille bilatérale, préventive, etc. Il m'a toujours semblé que chacune de ces opérations présente des inconvénients et des avantages tels, qu'il est souvent bien difficile de se décider pour l'une ou pour l'autre. En conséquence, je me suis livré à la recherche d'un procédé qui pût réunir, si c'était possible, tous les avantages que présentent les divers manières de pratiquer la taille et qui, pourtant, eût moins d'inconvénients que chacun d'eux en particulier. Chaque opérateur aime avec prédilection un des procédés opératoires, et il l'exécute le plus souvent; mais en certains cas spéciaux, il est obligé d'y renoncer et de recourir au contraire à quelque autre. On rencontre

étaient ces cas spéciaux, là où il y a une pierre très grosse. Dans ces cas, on l'on coupe la pierre en trais pour l'extraire en petite morceaux, ou bien on pratique la taille préventive, bilatérale, multistadiée. Mettons de côté le premier procédé, pour lequel je voudrais souhaiter de n'être jamais obligé de le pratiquer: parlons des autres qui présentent bien des inconvénients et peu de ressources, ne permettant le passage à de gros calculs qu'en faisant une dissection brève ou bien en déchirant en parties. Mon procédé est celui qui ouvre une plus grande voie que tous les autres, qui évite plus strictement que les autres la trépan artériel, l'extirpation et les diverses artériectomies, et que loin d'en produire des fistules urinaires, contusions, comme les autres procédés, produit une blessure qui cicatrise promptement comme la taille latéralisée simple. Je l'ai expérimenté cinq fois à la clinique et dans ma clientèle privée; mes confrères les D^{rs} Piersant, et Francini, Polidori, Rilli etc. l'ont également expérimenté, et il a donné des résultats tels qu'effrayants. Ce procédé opératoire que l'on pourrait appeler oblique, pour le distinguer des autres se pratique de la manière suivante, et demande un appareil instrumental des plus simples.

1° Un cathéter cannelé à courbe, assez long et le rebord gauche de la cannelure à peine indiquée pour permettre d'y passer le bistouri à plat.

2° Un bistouri ordinaire pointu à lame étroite.

3° Trocart et canette hypodermique.

Le malade est mis dans la position ordinaire, les ailes dressées, à leur place respective; le cathéter introduit, sa tige est maintenue dans la direction de la ligne axo-épiploïque, son bec tou-

chez le piérier, il est donc dans la vérité. On le soule à un angle qui tient le caustique fixe dans cette position et appliqué contre l'arcade du puits. L'opérateur introduit le doigt indicateur gauche dans le rectum pour s'assurer qu'il est vide et pour reconnaître ses caractères, particulièrement l'infirmité qui parfois est très prononcée en avant; pour reconnaître en même temps l'état de la prostate, etc. Ensuite, suivant qu'il le juge convenable, ou il retire le doigt, ou il s'en sert comme d'une pince en fixant l'angle du pouce de la même main transversalement sur le raphe à 20 cent de la tangente de l'anus. Tenant le bistouri comme une pince à force, il se penche le tranchant d'abord sur le côté droit du raphe, à une distance telle que le bulbe soit respecté, l'incision commence à un cent du raphe et à 15 millimètres au-dessus du point marqué par l'angle du pouce gauche, elle descend en bas obliquement, par conséquent elle évite le côté droit du bulbe, elle gagne le côté gauche du périnée pour s'arrêter à une égale distance entre l'anus et la tubérosité de l'ischion. Cette incision présente deux courbes légères en forme de S, et a l'avantage de respecter parfaitement le bulbe et le rectum qu'elle contourne, tandis qu'elle a une longueur qui dépasse celle de tout autre procédé. J'approfondis cette incision, je vais à la recherche de la capsule du cathéter, je m'assure du sommet de la prostate, et dans un point voisin de sa limite, je plante la pointe du bistouri dans l'urètre membraneux. Le cathéter, placé presque à plat, coupe le sommet de la prostate, dans toute son épaisseur, dans la direction de son rayon oblique inférieur gauche. Je pousse le cathéter un peu

en avant, jusqu'au point du col de la vessie. Je la maintiens fixe dans cette position; j'insère alors entre le dos du couteau et le cathéter le doigt indicateur gauche que je pousse jusqu'à dans la vessie; de cette façon, le couteau toute sa pression la prostate dans le rayon indiqué et respecte le col de la vessie. J'enlève le contenu et je guide sur le doigt les tenettes droites; et à peine se sont-elles engagées sur le col de la vessie que je les ouvre pour opérer la dilatation du col. Le dilatateur de Mirimón de Bucletis pourrait même représenter quelquefois sur la planchette à opération. Après cet acte opératoire, je retire la pierre et j'en fais l'extraction.

Je rappellerai deux de ces opérations pratiquées avec ce procédé parce qu'elles sont dignes d'attirer l'attention.

J'ai opéré dans le clinique un certain Vincent Vancou de 58 ans, en présence des frères et des Prof. Borel et Zannetti. L'opération fut rapide, le calcul très dur avait dans sa plus grande circonférence 24 centim., et 15 dans la plus petite; 9 cent dans la plus grande diamètre, 6 dans la plus petite. Il avait la forme d'un ovale aplati. 33 jours après l'opération, le plexe était parfaitement cicatrisé, et quelques jours après, notre opéré sortait de l'hôpital guéri tout à fait.

J'ai opéré par le même procédé M. Jansard en présence du Prof. Zaccarini et des Dr^s Mantovani et Bassi. Le malade souffrait d'ulcères devenus depuis trois ans, il avait supporté divers traitements curatifs, parce que personne n'avait jamais pu trouver la pierre. Je pus un jour la toucher avec certitude, et je proposai l'opération. Après avoir porté mon

dougl dans la venue, je sentais vers l'ordice de l'artition droit une surface dans laquelle, de la largeur d'un verre au six et seules sur la même surface que le membrane membrane de la venue. Mes confrères convenant avec moi qu'il s'agissait d'une pierre enchâssée dans l'épaisseur de la paroi ventricule. Grâce à mon incision oblique, je dominais facilement avec le doigt le cavité ventriculaire, je pris une carotte à extrémité crochue (l'ancienne carotte de Celse), j'écrasais la pierre tout autour, je portai par derrière le bec crochu de l'instrument, et en tirant des deux mains sur la manœuvre, je parvins à dégager le calcul qui tomba dans le cavité ventriculaire. Je pus l'extraire alors facilement avec les tenettes. Il ressemblait exactement à un de ces bonbons vernis en chocolat dont une surface est parsemée au centre de petites dragées. Cette portion de la pierre devait être à découvert dans la venue; la tête était calée par la membrane membrane et caché dans les chairs. La face opposée aplatie, avait une apparence parsemée comme la pierre ponce, des filaments de chair s'y implantaient comme des racines. Cette pierre avait la forme et se déposant gris. Les dimensions d'une pièce de cent sous. Un mois après l'opération était parfaitement guéri.

SUR L'EXTRACTION DE LA PIERRE DE LA VESSIE

PROPOSITION DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

CHIMIE DES INSTRUMENTS

Lect. à l'Académie des Sciences, le 14 juillet 1879

On ne saurait douter que l'extraction de la pierre de la vessie ne soit une des opérations les plus difficiles, et les chirurgiens qui la pratiquent sont si peu nombreux qu'on pourrait croire que cette opération est encore soumise au secret. Ce n'est pas qu'il soit hanté pour les pasteurs des grandes villes de céder leurs malades aux spécialistes; non ce qui est certain c'est qu'en province et dans les campagnes, les pauvres patients sont condamnés à cadaver long temps les cruelles souffrances de la maladie de la pierre, faute d'être secourus promptement, et ne pouvant se résoudre à s'éloigner de leur famille et à se déister de leurs affaires pour se rendre à quelque localité lointaine, afin de subir l'opération d'un chirurgien expérimenté; et même pour ceux qui prennent cette détermination, ce n'est pas toujours le moment le plus propice. Que de gens, dans l'impossibilité où il se sont trouvé de réaliser ce projet, ont succombé aux souffrances de la pierre! Je me suis souvent demandé cette opération est-elle

donc réellement si difficile ? et l'hémiorrhéie p. ex. ne l'est-elle pas aussi ? Et pourtant cette dernière se trouve pratiquée dans les villages par tous les chirurgiens. Il s'en vient donc qu'ils n'hésitent de procéder à l'opération de la taille ? Il me semble que c'est par l'impression que j'apportais moi-même dans les premiers temps de mon apprentissage ou je devais pratiquer cette opération. L'idée de l'hémiorrhéie ne m'apparaissait guère, car je ne l'avais jamais apprise dans les opérations de la taille pratiquées par mes maîtres et par d'autres habiles chirurgiens. Je ne craignais pas non plus de léser l'intestin, que je croyais pouvoir facilement éviter par la taille intestinale ; mais j'étais préoccupé de devoir introduire aveuglément le bistouri dans les chairs du pénis et rechercher la suture du cathéter située profondément, pour me servir de guide afin de parvenir jusqu'à la vessie. En songeant que durant plusieurs siècles cette opération a été pratiquée sans le moindre guide du cathéter, je ne m'étonnais point de la répugnance ressentie par les chirurgiens et par Hippocrate lui-même pour ce genre d'opération. Une seule chose m'a toujours étonné, c'est qu'on ait tant tardé à imaginer le cathéter canulé, alors qu'existaient déjà les sondes et autres instruments pour traverser l'urètre de l'homme. Personne aujourd'hui ne saurait douter que cet instrument magique, appelé cathéter canulé, n'ait été inventé au XVI^e siècle, et que cette invention exclusivement italienne, ne soit attribuée à l'immortel Jean de Baccato de Crémone. J'ai rappelé cela à l'attention de votre Académie en 1855, et je lui ai fait observer que jusqu'alors le procédé opératoire de Romania avait

été mal interprété. Deux ans après, M^r Le Prof. José Baptista Pabbi de Bologne a développé élégamment le même sujet, (1) devant l'illustre Académie de Bologne, et en l'appuyant de témoignages incontestables. Et après, on a lu dans l'*Avvisio di Oliverio prefato*, 15 Janvier 1868, quelques leçons sur la taille, faites par le Prof. F. Palasciano près la Faculté de Naples en 1865 et rédigées par le Dr F. Tenore, dans lesquelles on interprète exactement le procédé de de Roussel; et l'on fit une mention honorable de mon travail. En 1865, je publiai dans le journal *Lo Spermatista*, le notice que j'avais faite précédemment à l'Académie, et dans laquelle je fusais remarquer que l'opération de Roussel, exactement décrite par Mariano Sarto de Barietta, dans son *Trattato nuovo de lapide ex vesica per lithotomiam extrinsecam*, loin d'être compliquée, selon le langage usité, dans la méthode italienne, basait au contraire partie de la méthode anglaise, et ressemblait en tout à l'opération telle qu'on la pratique aujourd'hui, et qu'on ne devait pas au plus étirer aux modernes la gloire de l'avoir simplifiée. Si l'on étalait sur la table un grand nombre d'instruments, il n'y en avait réellement que trois nécessaires: l'*infundibulum* (cathéter), le *scissore* (bistouri simple horizontal) et le *forceps*. Le *forale* et l'*exploratorio* étaient les sondes pour l'homme et pour la femme; les *distiches* et les *inferiores* servaient le *forceps*, mais on ne s'en servait qu'en cas de pierre très-volumineuse. Le

(1) *Discorso de Roussel, da Constanza de Cerna in occasione del convegno medico* - Bologne (1867)

servir de au louton et le coiffeur veut aujourd'hui résaler en un seul instrument, le coiffeur qu'on appelle aussi louton. L'apocryphe, c'est à dire le distillateur, c'est un instrument, qui peut rendre toujours de très-grands services. Que dois-je dire maintenant du *frangale*, instrument que les modernes appellent lithotrieur? Ceux qui aujourd'hui se vantent d'avoir inventé la méthode russe, en faisant le lithotome à la pelle, devraient lire le chapitre 12 de cet excellent ouvrage, et alors ils apprendraient que non-seulement l'idée en est ancienne, mais encore qu'elle a été admirablement appréciée par Kiriani et intelligemment reproduite. À propos de la simplicité de l'appareil instrumental, je rappellerai mille lithotomes, instruments plus ou moins compliqués, que les successeurs de Roussel ont substitués à ce trié-éti-gle novateur. Mais ces instruments ont-ils servi à perfectionner l'opération? Vous pourrez en deux mots les diviser en deux groupes ou de témoins d'événement en arrière, de dehors en dedans, ou bien ils incisent de dedans en dehors, de la vessie à la peau. Selon moi, on devrait s'abstenir de recourir à ces déviateurs, par la raison qu'étant couverts dans le vessie, quand on les retire, on coupe nécessairement cet organe, lequel devrait toujours être respecté. Chose étrange, que ces instruments aient été imaginés et produits par ceux mêmes qui soutenaient que les flûtes de la prostate devaient être respectées. S'il y a limite de la prostate, qu'il faut respecter, c'est précisément cet angle entre la prostate et le col vésical, et c'est avec ces lithotomes qu'en touchant le col vésical, on incise nécessairement cet angle. Par cette incision, la plie perd ses perillieuses, et l'urine

peut s'insérer par elle dans le caliculaire, ce qui peut rendre les conséquences de l'opération très-farouches. L'autre classe de lithotomes qui consiste de la pousse à la verge, que le tranchant soit limité ou illimité, découvert ou caché, glissant librement dans la cannelure du cathéter, ou s'y tenant emprisonné par un bouton comme celui de Auz de Bolognes, qu'ils soient gorgerez, gorgerez lithotomes-dilateurs, ne présentent qu'une utilité éphémère. En effet, à l'exception de leur inventeur, peu de chirurgiens s'en sont servis. La sonde, c'est à dire le bouton simple pointu, ou tout au plus le bouton bidenté est le meilleur instrument. Nous voyons donc que l'extraction de la pierre, loin d'être préconisée par Romani avec un grand appareil instrumental, était au contraire préconisée avec la plus grande simplicité. Moi aussi, j'étais resté attaché aux principes qui, à toutes les époques, avaient guidé les plus célèbres lithotomistes. Mais je dois avouer, comme je l'ai dit précédemment, que je me sentais saisi d'une vive émotion quand il me fallait pousser aveuglément jusqu'au cathéter, que je devais rechercher profondément la sondeuse, pour arriver droit à la verge. Je croyais que jusqu'au point retiré à peu d'utilité pour cette opération de tous les lithotomes imaginés jusqu'alors, il valait mieux abandonner l'idée, généralement introduite, de perfectionner la sonde, et de tourner plutôt l'attention sur le cathéter. Peut-être que cet instrument qui a rendu méthodique une opération livrée durant tout de suite à la discrétion des empiriques, peut-être, étant perfectionné, pourrait-il procurer plus de sûreté, de facilité, de promptitude pour l'opération.

Plusieurs ont eu la même idée, et je salue que depuis la seconde moitié du XVIII^e siècle, heureuse époque pour les fabricants d'instruments de chirurgie, un certain nombre de cathéters modifiés ont été inventés, décrits, présentés aux Académies et livrés au public: j'en connaisse plusieurs par le dessin, d'autres par quelques mots lus dans les livres ou dans les journaux, d'autres encore par le seul nom de l'auteur.

Palluot, florentin, domicilié à Paris, a décrit dans son traité (*Nouvelles remarques sur la Blennorrhée* Paris 1764) un cathéter muni d'une auge articulée, destiné à protéger l'intestin et à servir de guide au bistouri pour le traitement de la tumeur du cathéter.

Darvigny, en 1769, et plus tard, Lenoir, en 1799, présentèrent à l'Académie de chirurgie de Paris deux autres cathéters, dont je n'ai pu trouver ni une description exacte, ni dessins. D'autres instruments furent inventés, en 1787, par Bay-sur-Seine et Juch de Montpellier. En 1790 Deland a inventé un cathéter lithotome, et Blandin a décrit un en 1834. Enfin, en Savigny, selon l'opinion de certains bruxellois, a proposé un cathéter de la forme du compas. Dans l'annuaire d'instruments de chirurgie de S. M. Napoléon de Florence, on trouve le cathéter de Guérin qui ressemble beaucoup à celui de Magist de Pistoia, lequel, selon le système de Vesich, se déclarait partisan de la saignée médiane et pubien (*Novo metodo di Accedere allo-rectale in Parigi*, 1809). Je citerai enfin le cathéter du Dr Turpin, lequel a été décrit et décrit dans le Journal de médecine de Padoa, en février 1878.

On peut classer tous ces cathéters en trois groupes : on les ont la forme du compas dont la branche externe guide vers l'interna, et par conséquent dans sa rainure; on les portent avec un poignon ou dard la pointe de dehors en dedans jusqu'à la vessie; ou bien, mais de moins, ils passent de dedans en dehors en coupant d'abord l'urètre et les couches périculaires. Pour les deux premières catégories, on peut faire observer, que le guide est bien toujours, car lui de porter la pointe du cathéter dans la vessie, il la fait dévier précisément par la même raison pour la quelle il vous promet un guide sûr, de ne présentant aucun autre avantage : se contraindre de offrir des inconvénients, surtout celui de confier l'opération entre certaines limites voulues par l'instrument, etc. Ceux de la troisième catégorie sont presque nécessairement l'urètre. Vaineur, l'indication urétrale est trop large, tandis que celle de la peau est trop étroite, la plupart obligent à faire la taille médiane, et, pour la résistance qu'ils doivent surmonter, ce sont aussi d'instruments trop fragiles. Je dirai, en général, que tous ces instruments sont plus ou moins compliqués, et méritent sa vraie cathéter sa meilleure qualité, la simplicité. Cependant, je suis loin de vouloir faire une critique exacte et rigoureuse de chacun d'eux, car, je le répète, je ne les connais pas tous. J'admets aussi que l'idée de perfectionner l'opération de la taille, en modifiant le cathéter, ne soit pas de moi, il est possible que d'autres, que je ne connais pas, aient plus heureusement encore résolu le problème, et d'autres peuvent inventer un nouveau cathéter plus parfait que le mien. Peu importe, je soutiens au principe que

Comme

on

si l'on veut perfectionner la lithotomie, si l'on veut la voir généralement exécutée comme d'autres opérations, qui selon moi sont plus difficiles, on doit pousser à l'opérateur un grade plus apparent, plus sûr, pour partir avec le couteau jusqu'au col de la vessie. Or, si je n'eus temps, mon cathéter eût atteint ce but. Mais non, pendant longtemps, j'ai hésité entre des incisions plus ou moins compliquées; mais à la fin, c'est-à-dire au moment de partir définitive, j'ai repris mes études à ce sujet, et je suis parvenu à confectionner l'instrument, qu'après un certain nombre d'essais sur des cadavres, et un premier résultat fort-brillant sur un homme, j'ai la satisfaction de présenter au public.

À la première vue, on le prendrait pour un cathéter ordinaire. En effet, il en a la forme, et, à sa portion courbe, se trouve une large et profonde cannelure comme celle du cathéter simple. Mais au lieu de cette cannelure, est caché un dard également cannelé, lequel en introduisant le cathéter dans la vessie, tourne sa pointe vers la pierre. Son talon arrive au col-de-sac venant du cathéter, et il est armé d'un bouton à T qui entre dans la cannelure terminale d'une tige. Cette tige traverse l'instrument entier et finit au bouton / lequel est placé sur le manche. Pl II fig 4. En tirant le bouton et ainsi la tige, le dard est poussé horizontalement hors de la cannelure du cathéter, il traverse l'urètre mouchetant et tout le péricône. Lorsque le dard est presque tout-à-fait sorti de la cannelure du cathéter, il s'arrête, attendu que dans le muscle la tige rencontre un point d'arrêt. Le dard alors est fait sautement dans cette portion, comme on le voit dans

la figure. Si l'on veut repousser le dard jusqu'à l'endroit d'où il est sorti, on appuie sur le petit bouton *e* et on abaisse le bouton *f* en le ramenant jusqu'en-dessous du manche. Mais si l'on veut enlever le dard du cathéter, on appuie également sur le petit bouton *e* et l'on allonge un autre morceau de fil, ce qui fait que le dard tombe immédiatement par terre. Le cathéter se trouve alors réduit à sa première simplicité. Les notions anatomico-topographiques nécessaires pour effectuer cette opération, la connaissance exacte de l'instrument et le toucher du côté du périspée et du ventricule donnent des renseignements parfaits pour établir jusqu'au mill le point de l'urètre et du périspée qui doivent être traversés par le dard. Malgré cela il y a des chirurgiens qui n'ont pas de talent mécanique et de notions élémentaires d'anatomie. Et comme ceux-ci vivent dans les provinces et à la campagne, ils n'osent pas procéder à l'extirpation de la pierre de la vessie. Pourtant après le succès de votre géométrique cette opération, j'ai vu le cathéter d'un index qui désigne exactement le point du périspée, où aboutit le dard. Cet index est une tige légèrement arquée en bas, qui termine dans son extrémité à T en forme de croissant et dans l'autre avec un petit anneau. Par cet anneau on le suspend au cathéter dans le petit bouton *e* fig. 3: la tige descend jusqu'au périspée, et la croissant, qui avec sa concavité est tournée vers le cœcyx, presse et étend convenablement la pierre et, faisant place avec le cathéter, comprime le périspée dans toute son épaisseur. Le dard aboutira certainement au-dessous de l'arcade. Dis-je maintenant parler des avantages de mon cathéter? Je les crois si évidents que je n'ai besoin que de les énoncer. Je

critique. En attendant, j'expliquerais la cause de ce qui se passe.

Je place le patient dans la position ordinaire. Je confie le cathéter à l'aide qui soutient la scissure, et après avoir examiné l'état de la prostate du péneau et du rectum, je place la partie droite du cathéter dans la direction de la ligne coxy-pubienne. Le dard, en s'échappant, perce l'urèthre membraneux et la périnée à peu près à 18 lignes de la marge anale. Si, à cause d'un volume exagéré de la prostate ou de la pierre, ou par un enfoncement exagéré de la troisième courbe de l'urèthre, on croit nécessaire de commencer l'incision plus haut, on ne devra qu'incliner un peu le manche du cathéter vers le ventre du malade, et l'extrémité du dard s'échappera à un point plus haut. Je rappelle que l'urèthre membraneux est en partie recouvert du bulbe; par conséquent, dans cette dernière position, il serait facile de lacer la substance bulbaire. Pourtant on peut éviter cet inconvénient en tournant un peu le cathéter sur son propre axe. Chez les enfants où l'obstruction de l'espèce oblige à utiliser l'incision plus haut sans crainte de lacer le bulbe, car on peut dire qu'à cet âge il est encore rudimentaire, cette position du cathéter sera utile. Ayant dans ma le cathéter à une direction appropriée au cas, on ordonne à l'assistant de tirer le bouton *f*, et si l'on préfère avec la main gauche. Bien, on confie à l'aide le cathéter déjà mis dans la direction la mieux appropriée. Alors avec la main gauche appliquée sur le péneau, on tient bien droite l'urèthre, et de la main droite déjà armée d'un bistouri étroit, long et biseauté, on tire le bouton *f* et le dard s'échappe de violence. Le sé de l'urèthre

qui vient par sa nature encourager beaucoup l'opérateur, qui en introduisant le bistouri le long de la commissure du dard et du cathéter, prodigue l'incision dans la direction proférée. On comprend qu'on pourrait aisément guider par le rectum jusque dans la vessie toute espèce de lithotome : quant à moi, je préfère le bistouri bistonné.

En se servant du cathéter commun, on n'est pas sûr, avec n'importe quel lithotome, d'inciser sans profondément qu'en le voulant, et qui provient des parties déplaçables du pénis et lesquelles doivent être soignées. Mais avec mon cathéter, ces parties sont tenues tellement fixes qu'on est sûr de couper jusqu'au millimètre. Plus le manche du bistouri s'éloigne de la pointe du dard, plus l'incision externe sera longue et graduellement plus droite dans l'intérieur de la prostate, au sorte qu'elle formera un vrai cône. De cette manière, il est impossible de léser le col vésical. Que si l'on voulait l'inciser, pour l'extraction d'un calcul très volumineux, cela serait facile, en appuyant le talon du contenu sur l'extrémité du dard et en faisant sortir le bistouri hors du cal-de-mac du cathéter, précédemment comme le prescrivent Vesich, lorsqu'il décrivait sa taille cathétère. Mais je crois que c'est une grande erreur toujours d'inciser la vessie : je soutiens que la difficulté pour extraire les grosses pierres provient plus de la prostate et des apophyses et ligaments périurétraux que du col de la vessie. En conséquence, je coupe la prostate à toute substance dans sa totalité, ne conservant point d'autre limite à respecter que l'angle entre cet organe et le col vésical. Je coupe toutes les pontes périurétrales avec une incision

à 15, que je commençai sur le côté droit du baïen, je le continuai sur le gauche, et je le portai jusqu'au point médian entre l'anus et l'urètre. Par cette manœuvre, ainsi que je l'ai plusieurs fois démontré, j'obtins la plus grande ouverture possible, beaucoup plus grande encore que celle de la taille lithotomale et qu'on dit latérale, et après avoir opéré l'incision, le globe reprit sa forme linéaire, et la cicatrice se forma promptement. Avec cette taille, j'ai obtenu un calcul qui avait 34 cent. de circonférence, et le 22^e jour la cicatrice était complétée. Je dois ajouter que, ce mégin marqué, au lieu d'inciser le corps vésical, je préférai surréaliser une prostate fort saillante, reproduite de nos jours comme moderne, d'aut-à dire que je pus faire prendre au lithotriteur et jeter la taille à la lithotrite. Après avoir fait l'incision, j'introduis au doigt ou la bougie dans le vésicle, ce qui me sert de guide pour les tenettes avec lesquelles j'extrais le calcul. Ce moment de l'opération est quelque fois difficile, soit parce que le vésicle est étroitement serré sur le pierre, soit parce que le trigone est très prononcé, (ou à cause de la tension de l'apophyse médiane péritivale, ou du volume de la prostate) soit enfin de la grosseur et de la forme du calcul. On peut en, si l'on veut, se servir de différentes tenettes à différentes formes, droites, courbes, articulées à forceps. Il me semble, qu'une tenette à branches articulées, comme celle de la fig. 4 P II peut être en petit cas de quelque utilité. Lorsque cette tenette a pénétré dans le vésicle, et ses branches doivent être bien ouvertes à cause d'un calcul volumineux, le résistances qu'elles rencontrent dans les parois de la vésicle l'obligent à

se couder, et de divergentes qu'elles étaient, elles deviennent parallèles entre elles. Il en résulte deux avantages : le premier, c'est que les extrémités des branches se trouvent bien mieux dirigées vers elle : cela peut devenir utile dans la même contraction spasmodiquement. Secondement, les deux branches, séparées de cette manière, glissent mieux entre le paroi vésicale et le col qui l'embrassent avec plus de facilité. Si le trigone vésical est profond, on dirige l'une des branches en haut et l'autre en bas, et celle-ci en se couvant descend de plus sur le trigone et passe plus facilement sous la pierre. De cette manière une seule tige agit comme droite et comme courbe, évitant ainsi l'introduction répétée d'autres tiges, et concourant à abréger l'opération.

Un mot encore sur le cathéter à dard. Quand pour la première fois j'en fis l'essai sur un cadavre, après avoir fait l'incision, je lui tentai d'abord d'approcher presque sans le point le prostate et son orifice. En introduisant le doigt, je trouvai à 4 centimètres de distance le col vésical, et l'ayant poussé plus loin, je pus mieux examiner le vésicle dans toute sa cavité. Alors je reconnus, que le cathéter à dard possédait en outre plusieurs avantages, celui de fixer la prostate, le col vésical et toutes les causes périmés à leurs rapports d'état normal. Souvent en entretenant le lithotome, on attache à peine avec le bout du doigt le col vésical : on se conclut que le périmé est haut, ce qui est contraire au fait anatomique que nous apprenons, que le col vésical est généralement à la distance de 4 ou 5 cent. de la surface cutanée. L'explication que quelques personnes donnent sur l'abondance de la couche adipeuse

et voir le volume de la prostate, n'est pas exacte, car on voit très souvent des patients ayant le périnée haut, qui sont très maigres et ont la prostate normale. Dans ces cas, à quoi attribuer la hauteur du périnée au moment de l'opération? Évidemment au déplacement des couches péritonéales profondes, qui est cause que la prostate et le col vésical peuvent s'enfoncer dans la cavité de la poêle, et s'éloigner de la surface cutanée et des couches superficielles qui se prêtent moins à la distension et à l'enfoncement. Ainsi le cathéter à duril s'appuie précisément à ce déplacement des parties et parait-il atteint des couches la cavité vésicale. Quel est l'opérateur qui n'appréhendera pas cet écartement qu'il excite la tubérosité en ne se servant que du bistouri pointu, comme je l'ai toujours fait moi-même dans les opérations de la taille excisées en clinique et dans ma pratique privée, qu'il accorde peu de valeur au prolongement de la cannelure du cathéter jusqu'en dehors du périnée, qu'il compte pour peu la facilité, la sûreté, la promptitude de l'opération associée avec le cathéter à duril, mais il ne pourra nier son utilité, consistant à resserrer et à fixer les parties qui composent le périnée, la prostate et le col vésical dans leurs rapports à l'état normal. Grâce à lui, les incisions sont plus régulières, prolongées autant qu'on le désire, même jusqu'à un millimètre; grâce à lui, on traverse le col et la cavité vésicale au minimum de distance de la surface cutanée.

J'avais déjà obtenu constamment dans les nombreuses expériences que j'avais faites sur des cadavres, aidé par M^r le D^r Marcon qui a toujours eu la complaisance de disséquer et d'examiner avec moi la pièce anatomique. L'incision et la balle cathétrale ont toujours

été respectés, de même que tous et une toujours soigné-
ments le col vésical et le triangle qui existe entre
ce dernier et la prostate. À plus forte raison, le plexus
vésical postérieur a-t-il toujours été respecté. L'urè-
thre très régulier de l'utérus membraneux de la
prostate et du périnée présentait un côté parfait avec
le bout sur le col vésical. Ces heureux résultats
m'avaient depuis quelque temps encouragé à per-
mettre ce minime, mais je devrais avoir d'abord la
section élargie. Quand mon excellent ami, le D.
Charles Paladru, médecin à Montpellier qui connaissait
le vil côté que j'opérais, me proposa une litho-
tomie sur un tout petit enfant. J'acceptai d'autant
plus volontiers que sur un enfant, je devais surmonter
toutes les difficultés. J'acceptai donc cette offre gé-
néreuse et mercredi dernier, 6 juillet 1898, je me
rendis à Montpellier où je trouvai deux autres ex-
cellents, à savoir que mes très chers collègues, les D.
Olivier Calot et Cruchet Vassini, qui voudront
bien assister à l'opération. Le petit patient se nomi-
me Jacques Garreau, premier-on de Juste Mattéoni
et de Laurent Corneillegue, sœurs, et l'un et l'autre
d'une bonne constitution. Le petit Jacques est né,
le 18 novembre 1896, à St-Maurice et Tado-cé et
jusqu'à un mois d'Avril 1899, époque à laquelle il a
commencé à remonter les premières souffrances dans
les voies urinaires. Il avait toujours joué d'une bonne
saute. Je l'avais vu avec mes autres collègues un
jour que M.^r le D.^r Paladru avait admirablement en-
tendu une lithotomie sur un enfant de 9 ans. Nous re-
couchâmes alors chez le petit Jacques une pierre dans
la vessie, mais cette pierre était si petite, que nous
espérâmes pincer la saute avec un lithotriteur pour

la réclame comme une prise de tabac. Le D.^r Paladini en fit l'essai avec un très-petit lithotriteur, mais l'indocilité de l'enfant rendit infructueux les efforts du bon Docteur qui, après six vains essais, à diverses reprises, se résigna à l'opération. Mais comme les souffrances s'étaient accrues, et que la pierre était devenue plus grosse, M.^r Paladini fut d'avis que la lithotomie était indispensable. Cette décision ayant été approuvée à l'unanimité, on résolut de procéder immédiatement à l'opération.

L'indocilité de l'enfant rendit d'abord difficile l'introduction du cathéter, mais l'ayant tiré sur un lit, nous avons pu l'introduire très-facilement. Après avoir mis l'enfant en position, c'est-à-dire sur les genoux d'un homme, qui maintenait les bras au dessus des cuisses du patient, je disposai le cathéter, puis ayant tiré sur le bouton, le dard sortit à 2 cent. du cercle anal, où l'intestin descendait en peloton.

J'introduisis le bistouri dans la roue du dard et jusqu'au fond du cathéter, en tirant d'un seul coup sur le rapet jusqu'à l'anus. La brèche des parties, la superficialité du col vésical, et même le petit volume du calcul me suggérèrent l'idée d'enlever un doigt dans l'intestin et presser la pierre à travers sa paroi et celle de la vessie. Il suffit et tomba dans mon autre main. L'opération dura moins d'une minute. L'enfant ayant été mis au lit, se calma peu à s'endormir tranquillement. Le sommeil qui survient après les grandes opérations pour conforter le malade, est l'expression de la nature, qui se débarrasse ainsi sabbatique.

SUR LES FISTULES VAGINALES

CONCERNANT LA MÉTHODE DE LEUR GUÉRISON
ET CLASSIFICATION.

En entreprenant de traiter la question des fistules vaginales qui ont formé le sujet de tant d'utiles travaux publiés dans ces derniers vingt ans, je n'ai certainement pas la prétention de présenter une œuvre complète. La vaste bibliographie sur ce sujet offrirait de nombreux matériaux, et il ne serait pas difficile de les coordonner dans un ouvrage scientifique, mais en m'adressant à des lecteurs étrangers dans l'art, je leur dois faire seulement la simple exposition de mes idées et des résultats de ma pratique.

Assurément, ce n'est pas à l'Amérique que revient le mérite de l'idée première qui donne la méthode par nature pour le traitement des fistules vaginales. Fermer une plaie, un orifice par une nature, c'est là de l'empirisme vulgaire. Mais les fistules vaginales présentent de grandes difficultés pour obtenir la nature par des procédés appropriés. L'histoire nous raconte les nombreux efforts tentés par d'illustres chirurgiens pour arriver au but désiré : on cite notamment avec honneur les noms de Boerhaave d'Amsterdam (1664); de Vesling de Stuttgart (1722); de Wasse à Pado (1733); de Nagels de Manchester (1812); de Barnes

(1813), de Lallemand de Montpellier (1824), de Deyher Strmann; de Malagodi de Bologne (1828); de Fabbric du Langier (1829), de Duval de Londres (1831), de Barikar de Wratislaw (1832), de Froget de Paris (1833), de Daublenbach de Berlin (1836); de Wüster de Bude; de Veipera; Joliet de Lagnelle; Samsen; de Maron (1854); etc. Mais si parmi tous ces chorégraphes, si parmi les auteurs et les vulgarisateurs de la méthode Américaine, vous ne trouvez le véritable colateur de l'opéra-tion. L'art marche dans la voie du progrès, parce que tout le monde est en train; et de quelque côté que parte l'impulsion, elle se propage en tous sens, comme les vibrations d'un org. Hayward de Boston, Ponceau, Marion Shaw, Bonneau, Baker-Brown, Simpson ont redécouvert les procédés et les moyens de mettre en pratique l'opéra-tion, et de cet état l'art est arrivé à un tel point de perfectionnement, soit pour le matériel d'opéra-tion, soit pour les instruments, qu'avec toute les ressources matérielles dont ils peuvent profiter, ils ont pu avec quelques efforts arriver à imaginer et à donner la dernière main à une opération que leurs prédécesseurs n'avaient fait qu'ébaucher. Dans toute opération, je distingue l'idée abstraite, la raison silencieuse, le but ou l'effet immédiat de toute la série des manœuvres et des notes qui en dépendent, et qui conduisent à son exécution. Cet ensemble d'idées et de manœuvres forme pour moi le procédé opératoire, tandis que l'idée abstraite me représente l'opéra-tion ou la méthode opératoire pour me servir d'une expression usitée. En partant de ce principe, je ne puis accorder à personne, à moins que ce ne soit à Hœnigksson, le mérite d'avoir inventé la méthode par nature pour

cette opération l'admette ou contraire un grand nombre de procédés plus ou moins utiles et bien dirigés. Par exemple le Dr Sims, comme tous les autres déjà cités, n'a eu propre qu'un procédé, très utile il est vrai et contenant tout ce que présentait de mieux les autres procédés de ses prédécesseurs. Le procédé de Sims a subi à son tour un grand nombre de modifications soit en France, soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie. La clinique est donc à présent riche en statistiques. Chaque opérateur a donné des règles, des préceptes; et quelques auteurs parmi les plus récents affirment que cette opération est facile et presque toujours infallible. Se trouve-t-elle donc arrivée au faîte de la perfection? Je suis convaincu que ceux qui se trouvent à la tête des grandes cliniques penseraient comme moi, que c'est là une erreur. Tout en pratiquant l'opération, en se conformant aux meilleures règles que l'on présente, il n'en faut pas moins conclure qu'elle est difficile, qu'elle demande un temps assez long et qu'elle est loin de donner un résultat certain. Je n'entends enlever à personne ce qui lui appartient; j'ajoute les statistiques que l'on a mises en avant, mais je ne leur accorde que le valeur qui leur appartient. Un opérateur rencontre 20 fistules, il en opère 19, et les 10 autres qu'il juge incurables, ne figurent pas dans sa statistique. Sur les 19 opérées, il varie à succès. Un autre en voit seulement 10, il les opère toutes, et obtient 6 succès. Laquelle des deux statistiques est la meilleure? Je ne soutiens pas mon opinion parce qu'elle m'appartient, car elle est générale. Un grand nombre de chirurgiens et d'obstétriciens qui rencontrent des fistules vésico-vaginales

ne pratiquent pas l'opératoire, parce qu'ils reculent devant ses difficultés; et quand je les consulte, par la presse médicale, l'appareil de prothèse que j'ai inventé, au moins de 14 chirurgiens de diverses provinces d'Italie m'écritient pour me le demander. En outre, les cas de fistule sont fréquents, et pourtant on n'en voit que très rarement cités sur les journaux; c'est cependant une opération que l'on aime à bien connaître. Je ne dirai rien sur le temps très long qu'elle exige pour être achevée; car tout le monde sait que même dans les mains des opérateurs, elle ne dure pas moins d'une heure, et j'ai vu des chirurgiens d'une grande habileté opératoire ne pas mettre moins d'une heure et demie en de deux heures. Enfin quant au succès, je pourrais citer des opérateurs très habiles et très heureux qui n'ont jamais eu la satisfaction de voir complètement guérir une fistule vésico-vaginale qu'ils avaient opérée par la suture. Ainsi le dernier cas n'a pas été encore guéri sur cette malade; et en rendant l'opération aussi facile pour permettre à tous les chirurgiens de la pratiquer, en abrégant les actes opératoires et surtout la durée de l'opération, en la rendant moins douloureuse, en augmentant les probabilités pour un bon résultat, on aura certes apporté une utile contribution à l'art. Faisant ici un peu de mots et synthétiquement ce que j'ai vu et ce que j'ai fait pour guérir une ulcération rétrovésicale ou pour en dissiper les effets si incommodes.

À la rigueur je n'ai pas recréé de fistule, et je crois que dans la plupart des cas, cette discussion est inexacte. L'urètre vésical et l'urètre vaginal se mettent en communication directe, se fondent en-

semble, en un mot il n'existe pas de sujet ou de fœtus proprement dits. La clinique et une clientèle privée m'ont fourni 50 cas de fistules :

Fistules vésico-vaginales	13
« uréthro-vésico-vaginales	3
« vésico-vésico-vaginales	1
« recto-vaginales	2
Destructions totales du vagin avec large ouverture vésicale	1
	50

Étiologie des fistules vaginales

Si l'on excepte seulement deux fistules (l'une recto-vésico-vaginale produite par un chancre syphilitique et l'autre vésico-vaginale occasionnée par une éponge double à cheveux qui, introduite dans la vésice et devenue le noyau d'une grosse pierre, avait perforé la paroi vésicale et la paroi vaginale), toutes les autres s'étant déclarées après un accouchement long et laborieux.

Deux peupées tentes, j'ai rencontré un fait de quelque intérêt pratique: une vaginite chronique plus ou moins ancienne avait précédé l'accouchement et pouvait avoir exercé une certaine influence sur la production de la fistule en agissant de deux façons: le vagin ayant perdu la faculté de se dilater sans retarder la parturition et la constriction de ce canal avoir été plus facilement suivie de gangrène. Il est à remarquer que les fistules vésico-vaginales sont de

beaucoup les plus fréquentes, ce qui sert encore à démontrer que l'obstacle au passage de la tête est principalement fait par le vagin, lequel précède la tête dans sa descente, il se ferme au préalable du vagin, et par conséquent ce n'est pas l'effort mais bien le vagin qui se trouve plus après la tête du fœtus et l'accès du pubis.

Sur les 18 cas, le forceps avait été appliqué 19 fois, chez les autres l'accouchement avait été spontané; je pus néanmoins me convaincre que l'application du forceps n'avait pu contribuer à la formation de la fistule, et que dans le plus grand nombre de cas, il avait été appliqué par des sages dans l'art des accouchements. Les ganglions avaient été le plus-part du temps avec écoulement, mais très superficiels, tandis que le perforation s'était produite sur un point limité et circonscrit.

Voici encore une autre raison qui montre que les fistules ne dépendent pas entièrement de causes mécaniques ou traumatiques. Onze malades étaient primaires; les autres avaient eu plusieurs enfants.

À l'époque de la parité, j'avais de 18 à 25 ans; les autres étaient entre 35 et 45 ans.

En général, elles étaient toutes bien conformées, et avaient toujours peu d'une bonne santé.

Les fistules que j'ai observées étaient situées sur divers points du vagin, comme je l'ai indiqué plus haut.

Le plus grand nombre présentait une figure ovale plus ou moins indistincte, avec le plus grand diamètre se rapprochant d'une ligne transversale. Si elles existaient déjà depuis nombre d'années, outre qu'elles étaient assez étroites, elles avaient pris une forme ronde.

Je n'ai pas vu de fœtales ayant un diamètre supérieur à deux centimètres, et j'en ai trouvé une si étroite qu'elle permettait à peine l'introduction d'un stylet, et pourtant elle devait passer à toute l'arête. Je crois qu'une membrane tœdœde a pu donner trop souvent ces diamètres de 4 et 5 centim. Fœtales-fœtales-très récentes, l'extensibilité des fœtus est très grande, aussi peut-on, en soulevant, facilement allonger le hochonnetre fœtaleux.

C'est encore de l'ancienneté de la fœtale que dépend la régularité de ses bords; car j'ai vu les anciennes fœtales, c'est-à-dire toutes celles qui avaient plus de deux ans de date, avec des bords nets, réguliers et minces. J'en vu en contraire le prolapsus de la membrane maxime de la vaine exister dans celles-ci, tandis qu'il était absent dans les fœtales récentes. Ce prolapsus dépend avant de l'état de vacuité constante de la vaine, tandis que dans les cas où la vaine retient encore l'arête jusqu'à un certain point, je l'ai vu être à un degré infiniment moindre ou je ne l'ai pas observé du tout. Le bord de la fœtale, après quelque temps, (un an ou deux) devient poli, dur et régulier; plus poli que le tissu environnant, il acquiert une consistance fibreuse. Dans un cas, on aurait dit un point lacrymal gigantesque; il était comme renforcé par un anneau cartilagineux. Je ne puis pas ici le distinguer des bords que j'ai rencontrés dans les premiers mois; je rappellerai seulement en passant que l'on trouve alors des dépressions larges et superficielles proportionnées aux larges lacunes de tissu gangréne qui, pendant les premiers jours, sortent de la valve, comme si tout le vagin s'était

exalté. La constriction qui remplace ces lézons, est aussi large que si la membrane muqueuse s'était véritablement reproduite. Malgré cette régularité de la constriction qui ressemble tellement à la crampée, on a souvent la sensation et la sécheresse du vagin, ou bien du flux inodorable qui se distribuant en forme d'aiguë ou de brido peut produire une striction du vagin plus ou moins prononcée et l'attacher aux parties voisines et même en quelques points de l'écrou du pubis, comme je le dois ci-après. Les crampes, les excoriations, les pustules produites par le passage irritant de l'urine s'observent à divers degrés, et l'usage des urines qui n'est pas des moins indifférentes consiste dans les qualités de l'urine et l'état de la vessie. En effet, si il existe un certain degré de cystite, la sécrétion mucopurulente s'agit sur l'urine, l'altère, et il se forme, comme chacun sait, le carbonate d'ammoniaque. J'appelle l'attention sur les considérations qui précèdent, parce qu'elles m'ont servi de guide sûr dans le traitement avant l'opération. Je passerai sur les symptômes et sur le diagnostic parce qu'ils ne m'ont rien présenté de particulier. L'urine de suite aux moyens curatifs que j'ai employés. Au lieu de faire un examen des divers cas observés, j'aime mieux en présenter un tableau synthétique, en me conformant à la classification que j'ai déjà faite.

FISTULES VÉSICO-VAGINALES

1

Je suis convaincu que la suture est préférable à toutes les autres méthodes. Les malades qui entrent dans cette première classe, ayant été pour la plupart soulagés aux traitements les plus divers et sans résultat. Je ne veux point dire par là qu'il faille pratiquer la suture dans tous les cas. Pour obtenir de bons résultats par cette méthode, il faut apprécier certaines conditions sous lesquelles il vaut mieux ne pas opérer pour ne pas compromettre l'art. Je dirai tout d'abord que je n'ai pas voulu opérer quelques-unes de ces fistules parce qu'elles dataient de trop peu de temps. Je crois qu'il est utile d'attendre au moins 6 mois, et mieux encore un an, pour donner le temps à la nature de venir en aide avec tous les moyens dont elle dispose. J'ai vu qu'en attendant, les fistules sont devenues beaucoup plus étroites, les bords se sont régénérés, et le vagin a pu même céder aux instruments dilatateurs, etc. Une de ces fistules a été guérie complètement après le troisième mois et par les seules ressources de la nature. J'ai utilisé le temps pour combattre toute trace de cystite et de vaginite et pour placer les tumeurs dans les condi-

tous les plus favorables afin d'obtenir une situation immédiate. Je n'ai pas éprouvé deux fistules qui étaient situées sur du tissu induré avec stricts très prononcés du vagin. Mon attention était de pratiquer l'occlusion du vagin, mais les malades ne voulaient point s'y soumettre. Quant aux autres fistules que j'ai traitées, voici mon manière d'opérer mon procédé diffère en bien des points de ceux que l'on a proposés jusqu'à présent, et pour l'exécuter j'ai dû inventer de nouveaux instruments. L'appareil instrumental se compose:

1° un spéculum.

2° un crochet suspenseur articulé vésico-vaginal.

3° un double crochet suspenseur vésico-vaginal.

4° petites fourchettes de formes diverses.

5° une pince à nouveaux porte-fourchettes.

6° une pince double à queue pour le retournement.

7° deux biseaux courbes, droit et gauche.

8° pince courbe à égrègne.

9° des aiguilles tubulaires de diverses formes qui peuvent se fixer sur un conduit pile-aiguille.

10° gâchettes et tireurs des anses du fil métallique.

Je présente sans silence les autres gâchettes parce qu'aujourd'hui on donne la préférence à celle de Sims. Les anses en diffèrent parce qu'elles ont une courbe dorsale (Pl. III, fig. 2, b, c, d) adaptant à la région sacale qui forme le prolongement de la face interne du sacrum. Cette courbe s'éloigne de la ligne droite d'environ 2 cent. de là il y a un avantage

qui consiste à pincer X avec d' espèce; X' cette courbe vient s'appliquer derrière la fourchette de la vulve, et la gouttière ne peut glisser, X' le vagin qui prend une ligne très courbe se raccourcit, et portant les lèvres profondes se rapprochant de la vulve. J'ai remarqué que l'on voit beaucoup mieux avec les gouttières étantes qu'avec les larges, et que les gouttières courbes, sont encore préférables aux larges. J'ai une série de gouttières, parce que j'ai toujours trouvé dans chaque cas spécial la gouttière qui s'adaptait mieux que toutes les autres. Cette gouttière vaginale est montée sur un manche spécial Pl III, fig. 1. Dans le manche, a , se trouve placée une petite échelle métallique, qui se termine avec une bécquille e , où l'on place la gouttière fig. 2, a , et de l'autre côté sortent deux petites ailes fig. 1, b , c . La petite échelle s'allonge et se raccourcit en rapprochant ou bien en écartant les deux petites ailes; par conséquent il arrive que la gouttière s'approche ou s'éloigne du manche. Le bouton fig. 1, d , est une vis à pression qui fixe la gouttière au point où elle est mise. Le manche se termine en forme de Y, fig. 1, f , f , et il s'articule à ses extrémités avec un arc ovalé, lequel a un mouvement de bascule. Le grand angle de l'ovale est discontinué; et ses extrémités, en formant un angle droit, prennent appui sur l'arcade du pubis en laissant libre l'urèthre. L'autre pôle de l'ovale est traversé par une colonne à double bouton k , pour le fixer au grade d'inclinaison que l'on veut. Ce mouvement permet que les deux gouttières pubiennes s'adaptent bien à toutes les femmes.

Le crochet suspenseur véméo-vaginal articulé Pl. V, fig. 2, est une tige métallique munie de deux

anneaux latéraux et un bouton terminal δ : l'autre extrémité est légèrement courbe. Cette dernière se d'articule pour un cent et demi, en tournant le bouton δ jusqu'à se mettre à angle droit et former une ligne droite.

Le crochet double suspendeur *Yemba-naguel* Pl. III, fig. 3, consiste d'une tige revêtue d'une capsule, β de manière que, des deux stylets, α , α , l'un se continue sur la tige, l'autre sur la capsule. Sur le manche, il y a un gland divisé en deux moitiés, dont l'une se continue avec la capsule, et l'autre avec la tige. Le manche fait confirmation à celles-ci. En tournant les deux moitiés du gland sur leur axe dans une direction opposée, les deux stylets ou dégrées étant courbes se font divergents ou parallèles. Par un petit bouton ϵ à résort, les deux moitiés du gland restant fixes à quelques points où elles se trouvent. Les deux stylets étant parallèles, on les porte par l'ouverture distale en vuide. En tournant les deux moitiés du gland, ils s'éloignent divergents et fixes, et ayant alors cette forme Y, ils ne peuvent plus sortir de l'ouverture distale que' ils convergent en une boutonnière ayant une lèvre antérieure, l'autre postérieure. De cette manière, la paroi vaginale où est le champ de l'opérateur reste fixe et soutenue.

Les petites fourchettes Pl. V, fig. 4, ressemblent à la double pique des médecins bousillatons : elles sont légèrement courbes, et de grandeur différente.

La pince à anneaux Pl. IV, fig. 2, est un peu courbe aussi sur le plat et à point d'arrêt. Sur une de ses branches, s'articule un levier ϵ , δ qui soutient un petit compresseur articulé, lequel déprimé sur la fourchette dont l'instrument sera usé, forme avec elle

une pièce et serre le cruché de la manœuvre, qui se trouve entre elle et la fourchette.

La pince à sautoir Pl. IV, fig. 1, est formée de deux tiges continues et parallèles, courbées sur le plat a, a qui se rejoignent et se rapprochent ou s'éloignent à plaisir, selon que l'on pousse en avant ou en arrière la gâche b. On fait passer une des deux branches courbées sous les talons des deux fourchettes (Pl. VII, fig. 2) et l'autre sous les 4 pointes ou piques, et on les rapproche en poussant en avant la gâche b. L'instrument est armé d'un levier d qui sertent un compresseur c articulé. Lorsque il est abaissé, il serre le manche de manœuvre qui a été effleuré par les fourchettes et en même temps frict avec les fourchettes.

Le bistouri droit ou gauche Pl. V, fig. 1, s'adapte bien sous l'instrument précédent à cause de sa courbe et, en glissant sous les fourchettes, coupe cette manœuvre de manœuvre qui a été déjà soulévée par les fourchettes.

La pince dégras à ressort Pl. IV, fig. 3, peut servir à pincer le vagin et à le fixer en divers moments de l'opération.

Les aiguilles tubulaires Pl. V, fig. 2, ont des formes diverses, parce qu'elles peuvent servir à diverses usages. Chacune d'elles se peut monter sur l'extrémité du porte-aiguille, Pl. V, fig. 5, qui a la fig. rentée d'une cavité a. L'aiguille a sous son bouton une petite dent a qui entre dans une fente du trou terminal de la cavité fig. 3 a; par conséquent en tournant celle-ci autour de son propre axe pour un quart de cercle en b, l'aiguille reste validement fixée. Dans le manche du porte-aiguille qui se démonte en d,

est cachée une bobine de fil d'argent; le fil en traversant l'instrument entier, passe entre les deux petites roues, *c*, l'une desquelles roule entre deux calottes de la petite cage, et l'autre plus grande est soutenue par un ressort. En roulant cette bobine avec le bout d'un doigt (indicateur ou pouce de la main droite) le fil est poussé en avant ou en arrière. On ne doit pas le repousser en arrière plus de deux ou trois cent. car il n'est pas nécessaire et il s'entortillerait dans la manche.

L'appareil *Pl. VI. fig. 1.* est une corde légèrement élastique *b*, *c* terminée par deux petits anneaux *d* dans lesquels on enfle les deux bouts d'une anse. En poussant l'instrument jusqu'à la superficie muqueuse, l'anse se creuse ou s'agrandit. Pour la tordre lorsqu'elle est dans cette position, on ne doit diriger autre chose qu'éloigner de l'anneau médian *e* les deux latéraux *d*, ou bien, s'ils étaient dirigés, les rapprocher de ce dernier. En faisant cela, les deux petits anneaux *d* font six tours autour de l'axe commun, par conséquent les deux fils restent entortillés six fois. On retire l'instrument à soi un peu après le premier tour de torsion, afin de ne pas exagérer la situation. On peut agiter et entortiller l'anse en un instant, et avec une grande facilité et précision. Cet instrument peut aussi servir à bien d'autres uss, on peut p. ex. tirer des polypes du pharynx, de l'œsophage etc.

On place le melode dans le diaphragme latéral gauche (Hues), ou dans la position dite de la taille, (pelvi-dorsale Simon), ou sur les épaules et les genoux (Baker-Brown).

Quant à moi, j'ai pu me convaincre que dans chaque cas particulier, il faut en essayer plusieurs

avant de pouvoir déterminer la position à donner à la malade. Chacune a ses avantages propres, aussi est-il arrivé parfois que, dans la même opération, j'en ai fait garder une pendant le 1^{er} temps et une autre pendant le second. La situation sur le flanc est très commode pour la malade; et quand elle permet de voir aussi bien qu'avec les autres, elle doit être choisie de préférence. Cependant le cas est rare où il est indifférent pour l'opérateur de mettre la malade dans cette position ou dans une autre. Finalement même qui me fit l'honneur de venir me visiter à ma clinique, vint examiner une malade que je n'avais pas encore opérée, et l'ayant mise dans la position qu'il choisit de préférence, il ne put mettre la main à découvert. Il est vrai de dire qu'il s'agissait d'un cas des plus difficiles, mais je la donnai très bien avec mes opérations et en plaçant la malade sur le dos. En général, je choisis la position sur le dos quand la fistule est peu élevée, j'adapte celle sur les genoux et sur les coudes pour les fistules profondes, et dans le 1^{er} temps de l'opération quand, dans la position dorsale, il se produit un prolapsus considérable de la membrane vésicale. En choisissant la position, je place la malade sur un plan incliné de 45. degrés et je maintiens les cuisses dans la direction droite sur le ventre. Cet angle de 45, et encore davantage s'il le faut, favorise le prolapsus du vagin. Pour la seconde position, je place sur le lit une table verticale sur le bord de laquelle la malade appuie la région hypogastrique prolongée par un coussin, de manière que les genoux touchent à peine sur le lit. La poitrine de la malade repose sur un coussin mou, la tête de côté et les bras parallèles au tronc ou croisés sur le

examen de la tête. Il faut dans cette position recon-
ner à l'astrotéisme; mais ce n'est pas là une objection
bien forte; car cette opération est bien soignée et
comme je vais le dire, assez courte. Je peuvre une
tenue droite; je place dans la matrice à la hauteur
de mes poitrine. J'ai besoin de deux aides. L'un d'eux
peut être une personne étrangère à l'art; il se tient
à ma gauche; je lui confie le spéculum qui se main-
tient presque de lui-même. Le second assistant est à
ma droite et prend part aux actes opératoires. Après
avoir fait une injection vaginale, pressée les éponges,
de l'eau Pagliari, l'émoustillage Copolieri, un grand
irrigateur, etc., je dispose la matrice et les aides à leur
place; j'applique le spéculum; je l'ouvre autant qu'il
est possible; j'adapte convenablement les pinces
goniétrées pubiennes; je serre les vis à pression et
je confie à l'assistant l'instrument auxiliaire. Je di-
viser l'opération en deux temps.

Premier temps. — Il est rare que la fistule soit
rude, mais même dans ce cas, je peuvre une valant
qui trace une ligne transversale. Pour cet objet, j'ap-
plique l'épave double suspension tension-maginal
Pl. III, fig. 3. et la fistule prend la forme d'une bou-
tonnière Pl. VII, fig. 1, avec une lèvre antérieure,
l'autre postérieure. On ouvre une fourchette montée
sur la pince Pl. IV, fig. 2, et on la passe d'une ex-
trémité à l'autre de la lèvre postérieure entre la
muqueuse et la fibre conjonctive; la courbe et les
pointes de la fourchette restent visibles. On desserre
la pince, et la petite fourchette reste en place.
Jusqu' alors il n'y a pas eu de seule goutte de sang,
ce qui permet de bien voir le champ de l'opéra-
tion. On travaille également avec une fourchette de

la même manière la marqueuse de la ligne scissureuse. On porte dans le vagin la pince droite à requette Pl. IV, fig. 1, on faisant dévier sur un de ses côtés son compresseur pour ne pas heurter sur l'étréme supérieur qui se trouve encore en place, et avec les deux branches a a, on passe sous les talons et sous les pages des franchettes. Pl. VII fig. 2. On serre convenablement les deux branches en faisant avancer la queue b, on retire le double stylet suspendeur après l'avoir fermé on place le compresseur c sur la ligne médiane de la pièce et en le dépliant, les franchettes restent saines et fines Pl. VII fig. 2. Bénévoit alors on pen la requette, on retire en dessous la crosse légèrement courbe Pl. V, fig. 1, et, par deux coups de bistouri, on retire en une seule fois toute la membrane marqueuse qui entoure le fœtus. Cet espace de membrane disposé sur un plan, est représenté par un ruban. On comprend facilement qu'avec des franchettes à branches plus rapprochées ou plus éloignées, on obtiendra un ruban plus large ou plus étroit. L'instrument ainsi fait, présenté Pl. VII fig. 3, une surface lisse, régulière et sans des fureteurs de bois qui existent avec les autres procédés, avec lesquels on court encore le risque de laisser un petit point de membrane qui peut graduellement compromettre le succès de l'opération. Ce premier temps, quand tout a été bien préparé et disposé, peut durer de trois à cinq minutes. Je place un morceau d'éponge baignée dans du vin ou dans l'hémostatique Depolau, et j'accorde un peu de repos à l'opérée.

Second temps. — Cinq minutes à peu près suffisent pour donner un peu de repos à la patiente et pour arrêter l'écoulement sanguin. Je porte l'aiguille

à une extrémité transversale de la fistule, à deux mm du bord antérieur, je le passe presque perpendiculairement, et je lui fais décrire un arc de cercle pour comprendre une bonne portion de tumeur, je fais sortir le porte à 2 mm de la machine avant de côté à elle diamétralement opposé Pl. VII, fig. 4. À peine la pointe de l'aiguille se montre, je fais reculer la mandrille, Pl. V, fig. 3. et du porte-aiguille vers l'index de la main droite dévotée et le fil sort de l'aiguille; le fil avance très vite. Je pousse le fil autant qu'il faut pour former l'anneau. Cette précaution est nécessaire, afin que le fil parcourant l'aiguille tubulée ne vienne ni endommager ni user les chairs. Je passe de la même manière l'anneau sur l'extrémité opposée. Je passe ensuite les autres anneaux à la distance de 3 mm. Quand je dois faire plusieurs anneaux, j'ai soin d'introduire les fils de chaque anneau dans un petit tube de plomb et je les tire en les tournant. Je suis ainsi certain de ne pas les confondre et je procède plus sûrement. Dans les fistules très grandes qui ont la tendance à rester très larges, je place vers le milieu quelques fils alternés avec d'autres, ayant une anne plus ouverte pour comprendre une plus grande quantité de tumeur, et je commence à serrer les anneaux par l'un d'eux. Ce dernier acte de l'opération est très facile; je place les deux bouts d'une anne dans les deux petits anneaux *a* de mon instrument à tension Pl. VI, fig. 1, et après les avoir collés, je les saisis entre le pouce et l'index de la main gauche. De la droite, je tiens l'instrument à tension, c'est-à-dire que l'index et le majeur sont passés dans les deux anneaux opposés *d* et le pouce dans l'anneau *c* qui occupe l'extrémité de l'instrument. En le poussant en avant, j'ajuste et

je serre l'anneau quand le point de l'instrument est en contact avec les tresses, je commence à rapprocher les anneaux, temps pour que le fil central fasse un tour sur son axe ; et en dégageant l'instrument de 2 ou 3 des tresses, on voit en abaissant les bords du fil, je recommence à rapprocher les trois anneaux. Avec un peu d'habitude, on ajuste, on serre et l'on tend l'anneau en un instant et avec une précision parfaite. Si les deux petites anneaux de l'instrument à torsion sont froissés, de manière à permettre le passage des fils, il est inutile d'écarter les tresses en plaçant derrière pour soulever l'une les bords des anneaux avant de les passer dans l'instrument. Il faut faire attention de laisser les fils d'une longueur suffisante pour qu'ils dépassent la valve, autrement leurs pointes effleuraient les chairs, on doit observer avec cette règle, parcequ'il sera utile d'avoir les fils longs, quand on devra écarter la valve. Lorsque la valve est tendue, elle prend la forme rectiligne très caractéristique (Pl. VII, fig. 5).

L'opération est sans douleur, et lorsque on ne rencontre pas d'accidents graves, dans les cas accidentels, elle dure de 15 à 20 minutes. Je crains donc avoir atteint le but de rendre l'opération plus brève. De plus, dans le premier temps, le malade ne ressent que deux petites piqûres, au lieu d'avoir les tresses enfilées par des incisions, qui, si elles ne sont pas très douloureuses par elles-mêmes, deviennent insupportables par le temps qu'elles exigent. Enfin la surface opérée est faite avec une telle régularité, elle est si unie, si lisse qu'elle présente toutes les conditions favorables pour une réunion immédiate.

Je ne m'étendrais pas sur les soins consécutifs,

Si la sonde est bien tolérée, j'aime mieux la tenir à demeure, parce que la sécrétion de l'urine ne se fait pas régulièrement, et tandis que dans trois heures à peine cent grammes d'urine se verseront dans la vessie, au moins d'une demi-heure, il peut s'en accumuler plus du double. Le médecin qui attend trois heures avant de rendre l'opiole, trouve la vessie de nouveau dilatée, et la sécrétion de l'opéridien comprimée. J'ai observé que la sonde métallique, soit celle de M. Pollin ou autre, n'est pas si bien tolérée que la sonde en gomme élastique. Pour cette raison, je donne la préférence à celle-ci, et j'ai la précaution de l'employer toute petite et de la changer toutes les 12 heures. Mais dans quelques cas, la sonde a beau être petite, à double courbure, munie d'un valve-manneau, etc. elle ne peut être tolérée. Je préfère alors désigner une femme certaine d'instabilité et garder la malade le plus souvent possible. J'ai vu aussi qu'on ne pouvait donner une rigle générale sur les jours durant les quels il faut laisser les fils en place. Je ne parle pas des sutures faites avec le bouton de Bozeman, avec les petites boules d'ivoire, etc. ce sont là autant de causes d'irritation. Le canal du vagin ne doit pas s'apercevoir, s'il contient des corps étrangers; car autrement il entre en contraction pour les expulser. Tenez-moi après l'opération, j'ai vu une de mes opérées parfaitement guérie, et je lui ai osé de trouver une sonde métallique encore en place, comme ferait un pendant d'oreille, sans que le tissu en fût aucunement irrité. J'ai vu par contre, chez une malade qui n'avait pas été opérée par moi, tous les fils sauts de plomb tomber le cinquième jour, parce que le vagin était

collecteur. Je répète encore une fois que pour obtenir un résultat heureux, il est indispensable que le terrain de l'opération ne soit pas enflammé: c'est là que repose toute l'opportunité de l'opération. J'examine au microscope pour la partie, et si je ne trouve aucun point irrité, je m'abstiens d'enlever les fils. Les jours suivants, je répète la même inspection, et j'enlève les fils, un à la fois, en commençant par les moins importants, jusqu'à ce qu'en 10^e ou en 14^e jour, il n'en reste plus aucun.

FISTULE VESICO-UTERO-VAGINALE

J'ai voulu tenter la même opération pour un cas de fistule vésico-utéro-vaginale qui avait déjà été traité d'abord par le Dr. Kosztu au moyen de la cautérisation électrique et ensuite par le Prof. Zamboni au moyen de la suture par le procédé de Sims. Cette opération, vu les graves difficultés rencontrées par l'écoulement du vagin avait duré plus de deux heures. On avait ensuite pratiqué un grand nombre de cauterisations. Le vagin était presque en entier fermé par du tissu indurifié de cicatrice; il était entièrement stérile et court, au fond, on apercevait à gauche et au bas un petit tubercule représentant la lèvre postérieure du col stérile. au-dessus, à l'orient il existait une ouverture qui pouvait recevoir le bout du doigt qui entrant dans la vésie, la muqueuse de la vésie s'échappait à travers cet orifice. À droite du tubercule, on apercevait pendant la menstruation une rigole de sang, comme le commencement d'une saignée, et qui servait à indiquer l'orifice de l'utérus, mais on ne pouvait pas même y introduire un stylet. L'orifice consistait l'espèce de l'orifice vaginal. La malade, quoique jeune (30 ans) et

récente, n'avait que quelques laches de sang menstruel et encore non tous les mois. Elle souffrait d'une constipation opiniâtre qui revenait aux mêmes périodes, et tous les 6 ou 8 jours, le gros intestin était énormément disté par les matières fécales, on était obligé de recourir à des purgatifs énergiques. Le vagin, constamment vide, était revêtu par elle-même, très-petit, très-irritable, car elle avait subi de graves inflammations dans les opérations précédentes, car tout dans la première qui avait compromis la vie de la malade.

Pourvu que le résultat de l'opération serait été très-douteux, et comme d'ailleurs le vagin ne pouvait plus servir à aucune fonction, je proposai la méthode par occlusion; mais la malade s'y refusa, et j'essayai le sutura comme pour les cas ordinaires. L'opération présentait de grandes difficultés; j'étais assisté par le Prof. C. Borel, par quelques confrères et par les élèves. À l'exception de légères modifications exigées par le cas spécial, la procédure opératoire fut conforme à celle précédemment décrite. Et en comprenant le temps de repos accordé à la malade et l'incident d'un fil solide par lequel on tapait par un des côtes, toute l'opération dura 25 minutes.

Pendant les jours consécutifs, la malade garda parfaitement l'urine, et comme elle tolérât assez mal le caude, je lui accordais des heures de repos. Au 10^{me} jour, le vagin se trouvait encore parfaitement sec, les points de suture ne présentaient aucune trace d'ulcération ni d'irritation. Je voulus les laisser en place pendant deux jours encore. Quand je les

Orsi, la douleur ne revient immédiatement, et l'urine accède même à du pus, comme si l'on n'eût pas fait l'opération. Il ne restait plus qu'à pratiquer l'occlusion vaginale; mais le malade s'y refusa. Fera encore alors à mon moyen de prothèse, dont je parlerai plus loin.

PISTULE URÉTHRO-VÉSICO-VAGINALE

7

Parmi les trois fistules uréthro-vésico-vaginales, l'une appartenait à la clinique chirurgicale dirigée par le Prof. G. Bari. Le quadrimestre écoulé après avoir que l'on eût pris une détermination au sujet de cette malade. Les deux autres appartenaient à ma clientèle privée. J'en donne une brève notice.

M^{lle} A. B. âgée de 24 ans, bien constituée, svelte, lors de son premier accouchement, l'application du forceps faite par l'éminent Prof. Vassone. Pendant les 18 premiers mois de son mariage, elle avait constamment souffert d'une vaginite postaleuse produite peut-être par un épithéliome, que son mari portait sur le gland. (1)

Le vagin souffrant depuis un long-temps, non-seulement fut cause de douleur en perdant de sa distensibilité, mais de plus supportant mal la coïtation,

(1) Quelques mois après l'accouchement de sa femme, je dus, comme d'habitude, Prof. Bari et de destruction de mes malades, porter l'un tel homme l'application de la sape. L'examen microscopique de la tumeur, fait de concert avec le Prof. G. Felzani, rendait le diagnostic :

il tomba finalement en gangrène, quoique les secours de l'art fussent administrés avec promptitude et avec la rare habileté éprouvée du Prof. Yarnum. Mais même après l'accouchement, je pris la malade en traitement, grâce à l'obligeance du Prof. Salocchi. Le vagin permettait à peine l'introduction d'une plume à écrire. Peine de l'utérus, il y avait une cavité qui devait pu contenir une grosse noix. L'orifice était presque tout entier détruit; le col de la femme avait subi le même sort. On pénétrait dans la vessie par un orifice qui laissait passer le doigt, de chaque côté, deux brides de bois modulaire, partant de l'orifice latéraux qu'elle tenaient ouvert, laient étroitement le col de la vessie à l'arcade du pubis. La malade ne retenait pas même une goutte d'urine. La méthode par dilatation avait été employée plusieurs fois au moyen de dilateurs métalliques (épilation à plusieurs branches etc.) mais à peine s'était-il écoulé quelques jours, que le vagin était revenu aussi étroit qu'auparavant. En présence des Prof. Burns et Salocchi, je pratiquai deux incisions latérales à l'orifice latéraux et divergentes en arrière. Je prolongeai très-profondément les incisions, jusqu'à ce que le bistouri fût arrêté par les branches inféro-postérieures, je détachai les lambeaux glissant un peu avec le bistouri le long des os; je mis ensuite la sonde dans la vessie et un pessaire de Guttaï, fabriqué spécialement pour le cas, avec des dimensions proportionnées à l'étroitesse du vagin et muni d'un talon fort et résistant. Je flus le talon, tendu assez fortement pour provoquer la prolapsus du vagin. La paroi vaginale comprise entre les deux incisions cédait ainsi au frottement et prolapsus partiel. Le

brutisme pour, les incisions s'étaient cicatrisées, et même, avec le pessaire, cette portion du vagin restait légèrement dans un état de prolapsus; l'orifice fistuleux était plus petit, et dans la nuit le pessaire du premier suffisait pour que la malade restât toute l'urne, et lui parut de faire de longues promenades, encouragé par ce premier résultat, et dans l'espoir qu'en obtenant le prolapsus à un degré un peu plus prononcé, le malade put s'éviter l'incarcération du pessaire, je répétai les incisions profondes, parallèles aux premières, et à une distance plus éloignée, et j'appliquai le pessaire comme la première fois. J'obtins ainsi un prolapsus partiel de la demi-circumference du vagin, qui recouvrait et bouchait un très petit orifice, grand comme le n° 3 de la filière Charrière, et qui se trouvait dans le repli de la portion prolapsée. Tout le vagin était suffisamment large, puis qu'il permettait l'introduction de deux doigts. Mais cela importait peu. L'important, c'est que l'urine est parfaitement contenue, quoique la malade feroit de longues promenades de 4 et 5 milles, ait couru et sauté, la vessie étant pleine.

Le second cas n'était pas aussi grave. L'utérus était intact, l'orifice d'un côté de largeur était égal sur le col de cet orifice, dont se détachaient latéralement deux brides qui serrent le vagin et ainsi était d'ailleurs à l'état normal. L'urine se perdait entièrement. Je pratiquai encore ici les deux incisions latérales, profondes et j'appliquai le pessaire. On n'eut besoin dans ce cas que d'un léger prolapsus vaginal; l'orifice prit la forme d'une fente transversale à peine de 5 mm, et la fistule se compliquant se transforma en orifice vaginal. L'urine est main-

tenait parfaitement fermée, mais la malade est obligée de venir ouvrir le coffre, et quand elle revient l'avis d'arriver, elle doit le remettre de côté. L'avis sort tout entier par la boutonnière accidentelle, et j'ai l'espoir de pouvoir avec 1 point de suture guérir encore complètement cette malade.

DESTRUCTION TOTALE DU VAGIN

AVEC LARGE OUVERTURE DE LA PAROI VÉNÉRIE

Le cas de la destruction totale du vagin présente aussi assez d'intérêt pour réclamer un moment votre attention.

M. N. de 45 ans., après plusieurs accouchements heureux, éprouve la douleur fixe au milieu du souffrance vives et prolongées qui nécessitent l'emploi du forceps. Pour plus de brièveté, je commencerai l'histoire de cette malade au moment où je la pris en traitement, c'est-à-dire huit mois après l'accouchement. Elle était couchée dans un service de l'hôpital de Santa Maria Nuova, qui m'avait été confié. En écartant les grandes et les petites lèvres, on apercevait le méat urinaire, et en introduisant une sonde, on la voyait sortir à un cent et demi. La fourchette, le périnée persistaient à l'état normal. Au fond de la vulve, on rencontrait une ouverture qui permettait l'introduction de deux doigts; on entrant de cette dans une large cavité tapissée par le muqueuse rouge de gris plus, et le doigt recourbé en bras embrassant la symphyse du pubis et soullevant la paroi abdominale. Si l'on portait en même temps un autre doigt dans le rectum, les deux doigts n'étaient di-

vaiss, que par une pince en même, que l'on aurait
 cre avec pince qui d'était là le résultat de l'union
 des deux parties rectale et vésicale. En prenant les
 deux doigts très haut, et en faisant faire en même
 temps une pression sur l'hypogastre par une autre
 personne, on sentait descendre un corps sensible
 à un ouf dur, lisse, que le bout de chaque doigt
 pouvait toucher à travers la peau de la cavité où il
 se trouvait. Ce corps qui était lisse et pesait comme
 une langue, c'était évidemment l'utérus. Le malade
 d'avait heureusement plus eu les moindres traces de
 menstruation. J'invitai à une consultation les Prof.
 Poffense et Zennett, et je proposai l'opération en
 moyen de la suture. Je pratiquai cette opération en
 présence de ces deux Professeurs, et de nombreux
 élèves. Je modifiâi le procédé opératoire, les four-
 chettes ne servaient beaucoup pour éviter les bords,
 de manière à obtenir un rabat de bois d'un centi-
 mètre de largeur et tout d'une pièce. Je dus pas-
 ser les anses de fil métallique comme dans la sta-
 phyloraphie. Je dus prendre la direction transversale à
 la ligne de la suture. Le résultat fut complet. (1)
 Ce qu'il y a de vraiment curieux, c'est que le malade
 a eu après l'opération 4 ou 5 fois ses règles; mais
 le sang qui sort en petite quantité, sentait, il
 semble, de la menstruation vésicale: c'est une petite
 menstruation vicieuse.

(1) Dans le moment, le résultat fut complet; mais au 10 après,
 après avoir cette malade, je trouvai un petit bœuf dans l'angle que-
 que de la cavité, d'ici venait l'écoulement. Je crus qu'il venait de points
 de suture, ou plutôt d'écoulement le résultat complet.

PROTHÈSE DES FISTULES VÉSICO-VAGINALES

Pour terminer, je dois dire deux mots sur un appareil de prothèse qui a déjà donné de bons résultats, et pour ne pas entrer ici dans une description détaillée du premier cas, j'appelle l'attention des lecteurs sur un article que j'ai publié dans le journal *L'Anglais*, An. VII. N° 10. Je me contenterai d'un résumé des choses principales.

Clara N. de Sages, âgée de 59 ans, robuste et bien conformée, était accouchée pour la première fois, 18 mois avant d'être reçue dans la clinique chirurgicale; l'accouchement long et laborieux avait donné lieu à la gangrène du vagin et à une fistule-vésico-vaginale. Après être restée près d'une année dans la clinique obstétricale et dans le service du Prof. Balocchi, elle avait été confiée aux soins du Prof. Zanetti et enfin à ceux du Prof. C. Borel; elle avait donc subi dans ce long séjour à l'hôpital tous les traitements que l'on conseille en pareille occasion, et en dernier lieu, la suture métallique par le procédé de Sims, pratiquée par le Prof. C. Borel. Mais la fistule avait résisté même à cette dernière opération. Le vagin était assez rétréci par une grande

quantité de tissu de chaire; la fistule était située dans le cul-de-sac vaginal inférieur; elle était arrondie, circonscrite de tissu musculaire élastique, et son rebord était tout-à-fait lisse. Après une consultation tenue avec les Prof. G. Pellissier et Zanotti, on convint qu'il était inutile de tenter une autre opération, vu la grande quantité et la densité de tissu de chaire. Plutôt que d'abandonner le malade au désespoir, je fis construire un bouchon en ce genre, semblable à celui de Dupuytren pour la rumeur, et une pièce semblable également à celle de Dupuytren pour l'extirpation des canules incrustées, afin de pouvoir d'une en place le bouchon. La fistule ouïe à découvert avec mes spéculum et le bouchon avancé sur le pince, je pus aisément le porter dans l'orifice fistuleux, en sorte qu'une moitié du bouchon se trouve dans la voute et l'autre dans le vagin. Trois heures après, le malade sentit l'effet d'univer, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 18 mois, et dont par l'écoulement une quantité de liquide proportionnée à la petitesse de sa voute. Celle-ci regagna peu à peu sa capacité, et la miction se rétablit comme à l'état normal. Le vagin ne pouvait plus passer une seule goutte d'urine; le bouchon était solidement fixé en place et ne causait aucune incommodité à la malade. Cinq ans après, le bouchon tombe par hasard, et néanmoins l'urine continue à couler en touchant par l'orifice. Quelques jours après, Claire N. vint me trouver pour se faire examiner et heureux étonnement, et je pus constater que véritablement il n'y avait plus de fistule dans le vagin.

Le bouchon a duré dans ce cas tout ce qu'il pouvait promettre comme appareil de prothèse, puis-

qu'il a exercé une guérison complète. Mais on ne doit pas s'attendre à ce qu'il en soit toujours ainsi, tandis qu'il produit constamment l'effet mécanique d'empêcher l'écoulement de l'urine dans le vagin. Je puis citer encore un autre cas qui m'appartient. Je fus conduit par le Prof. C. Barci chez une dame Napolitaine, qui affectée depuis nombre d'années d'une large fistule vésico-vaginale ne voulait pas se soumettre à l'opération. J'examinai avec soin la fistule; je la construis en bouchon d'or, je l'appliquai, et, pendant un bon nombre de jours, l'urine sortit tout entière par le canal de l'utérus. Un soir que cette dame était au lit, le bouchon tomba, et elle ne voulut plus s'en servir. J'ai appliqué le même appareil de prothèse à la malade citée à la page 166. Je dois remarquer que dans ce dernier cas, il s'agissait d'une fistule vésico-utéro-vaginale (profonde de Jobert); je fus donc obligé de modifier le bouchon afin qu'il fût plus facile de le mettre en place et qu'il pût mieux s'adapter à la fistule. Je le fabriquer un bouchon comme à la Pl. VI fig. 2. Au centre du bouchon d'or est soudé à plat un petit cylindre *a* qui est percé par une série du même métal. Ce bouchon est tenu par une pièce Pl. VI fig. 3, dont on rapproche les deux branches *a* *a* en tournant une vis *d*. Je puis aisément avec cet instrument porter le bouchon dans le vœux ou l'écart sur la horizontale distale. Ouvrant alors l'instrument, en tournant la vis *d* en sens inverse, je le retire, et le bouchon reste dans le vœux. J'eus fait construire plusieurs paires de petits tubes en or de diverses grandeurs, *b* *b* fig. 3, pour employer celle qui s'adaptait le mieux à l'épaisseur de la cloison vésico-vaginale. J'entrai les deux

petits tubes à aux deux bouts du fil et après avoir mis entre boutons aussi de deux trous fig. 2. a. Prenant ensuite les deux file dans l'instrument à torsion, et posaient en avant, je mis l'un contre l'autre les deux boutons séparés par les deux petits tubes. Après m'être assuré que ceux-ci avaient la hauteur voulue, il me fut aisé de surer l'aube avec mon instrument à torsion. Cette fois encore, l'effet mécanique fut complet, mais la venue qui, ainsi que je l'ai dit, était la soigne, depuis environ un an, d'une inflammation qui par moments avait été violente jusqu'à compromettre la vie de la malade, ne put tolérer le bouton, et je dus l'enlever. Elle pourrait peut-être s'y habituer peu à peu, mais je ne puis l'affirmer, ayant laissé le service.

Encore deux mots sur ce bouton, à l'occasion d'un fait qui m'a été raconté dans une lettre trop bienveillante du Dr Passavant d'Andres. En voici traduits les principaux passages :

« Quand je lus dans le *journal d'Appert*,
 « votre article sur la fistule véico-vaginale, j'arrivai
 « en traitement à l'hôpital une femme de 33 ans
 « chez qui un accouchement laborieux avait été cause
 « d'une large fistule véico-vaginale. Elle était ma-
 « lade depuis un an, et je ne m'étais jamais déci-
 « dé à enlever la nature, découragé que j'étais
 « par l'insuccès des opérations précédentes et par
 « l'ampleur de la fistule dont les diamètres mesu-
 « raient 3 et 5 centimètres. Il me vint alors l'idée
 « que votre bouton pourrait m'être utile; j'en fis
 « faire un en se servant de gutta-serena; après
 « avoir serré les bords de la fistule en les sautant,
 « j'appliquai le bouton. Il m'a repété son succès

« naturel, et le visage se trouvait toujours sec. Quelques
 « jours après, le malade commença à se plaindre de
 « douleurs, et je levai le bouton qui était incrusté de
 « débris osseux (1). Mais à ma grande satisfaction, je
 « me vis que le fistule était considérablement rétrécie.
 « Je remis alors un bouton plus petit après avoir
 « tiré les bords de la fistule. Comme la première
 « fois, l'urine fut parfaitement contenue, et le bouton
 « resta en place pendant 15 jours; après quoi il fallut
 « le lever parce qu'il commençait à causer des dou-
 « leurs. Il était encrevissé de sole. Mais quelle ne fut
 « pas ma satisfaction quand je me l'arrachai! L'os
 « brisé reduit à un tout petit osselet! Depuis lors j'ai
 « employé les cautérisations et le goudron est pré-
 « que soigné ».

Je n'insiste pas sur le cas qui appartenait au Pro-
 fesseur Marzocchi de Padoue. Il avait opéré par le
 nature une large fistule, on n'avait obtenu qu'une
 cicatrisation partielle dans le tissu, il était par consé-
 quent resté deux orifices séparés par un petit pont
 de tissu. Il fit construire deux de mes boutons, et,
 me dis-ou, en ou, il les appliqua et n'obtint pas le
 résultat voulu. Tout en remerciant le Prof. Marzocchi
 d'avoir accordé quelques attention à ce qui j'ai pu
 dire, je crois devoir seulement noter que le cas
 n'était pas des mieux choisis pour augurer le suc-
 cès de mes propositions. Il me semble que les faits
 que je mets de citer auraient à cet instrument de
 prothèse, en moins d'une quelques cas, une utilité
 incontestable, et le fait du Dr. Fraumanti est digne

(1) Je dois noter que le bouton était en un remède de gomme-gutte.

de toute attention. J'ai fait fabriquer des appareils en gomme élastique Pl. VI, fig. 3 de diverses grandeurs, et je suis convaincu que non-seulement ils seront utiles dans quelques cas non opérables à cause de la grande quantité de tissu de cicatrice, de l'atrophie considérable du vagin, etc., mais ils pourront encore rendre de grands services dans les cas de fistules très-longues, pour les rendre plus étroites et les mettre par-là dans des conditions qui permettent de les opérer.

APPENDICE

Prothèse ophtalmique vaglo-cyclique pour la taillie

L'utile application faite dans une circonstance de mon opérateur étant plus haut, et l'importance du cas, m'incitant à mettre cette observation en appendice de mon travail.

Le 26 septembre 1885, je reçus dans la clinique chirurgicale que je dirigeais alors en l'absence du Prof titulaire, le sieur O. Borel, Marius Lorenzini, paysan de 34 ans, qui, depuis 3 ans, souffrait horriblement à cause d'une grosse pierre dans la vueille. Le volume énorme de la pierre, sa dureté, la cystite et l'intolérance à toute manœuvre me déterminèrent pour l'opération de la taillie. Les Prof Zanetti et G. Fellner appelés en consultation partagèrent et confirmèrent mon opinion. Je fis observer que dans des cas pareils où la pierre était très grosse, la méthode uréthro-cyclique avait occasionné quelques-fois l'insuccès, ce qui avait entraîné à tous les moyens employés par l'art. Il s'en était suivi récemment trois cas. Je voulais donc préconiser la méthode vaglo-cyclique, encouragé par l'expérience que dans le cas où il serait établi une fistule, elle aurait pu être facilement opérée, et elle serait facilement guéri, parce

que dans ce cas il n'y a pas perte de substance, absence de fissure médulaire et que les parties sont à l'état normal.

L'appareil instrumental est des plus simples, mais spécial : une grosse sonde cannelée, un bistouri droit et pointu, des tenettes courtes. Après avoir préparé la malade et tout étant bien disposé, je place la patiente dans la position ordinaire, j'applique le spéculum, je mets la sonde cannelée dans l'urètre, je la fais appliquer avec le bord postérieur de la gouttière, en faisant saillir le clipeau vaginal-cervical. J'entraîne le bistouri jusqu'à la cannelure du cathéter droit, et je le conduis d'arrière en avant, en faisant une incision d'un pouce jusqu'à 4 centimètres, du côté gauche, en respectant le col de la vessie. J'applique ensuite les tenettes, et j'enlève un calcul globuleux, marbré, excessivement dur, ayant une péripécure de 15 cent. Je ne voulais point pratiquer la suture pour m'assurer de la valeur ou non de cette méthode; je pris seulement la précaution de sonder les jours suivants la malade, le plus souvent possible. 24 heures après l'opération, le vagin ne laissa plus couler une seule goutte d'urine. L'opération fut pratiquée, le 20 octobre, et, le deux novembre, je pus montrer au Prof. Zanetti et aux élèves que la plaie était parfaitement cicatrisée.

EXPLICATION DES PLANCHES

DESCRIPTION DE LA PLANCHE I.

Coupe verticale médiane du bassin chez l'homme.

MATERIAUX. — On fait une incision sur la ligne médiane partant de la région hypogastrique, se prolongeant sur le symphyse etc. jusqu'à l'avant-dernière vertèbre lombaire. On divise, sur cette ligne, le sacrum et le pubis. Après avoir disséqué le rectum, on y fixe par une ligature un robinet. Le cadavre est maintenu dans la position verticale. On injecte alors par le robinet un liquide solidifiable ; dès que le liquide injecté commence à couler par l'orifice, on serre l'ouverture avec une pince, on pousse encore un peu l'injection, après quoi l'on ferme le robinet. On compléte peu à peu la division de la ligne médiane en incisant les parties molles, et avec une incision transversale semi-circulaire, on réunit les deux extrémités, hypogastrique et lombaire, de la grande incision sur la ligne médiane. Le moitié du bassin

avec le membre correspondant est retirée. Pour plus de renseignements, voyez pag. 44.

- a) Coupe de la symphyse pubienne
- b) Coupe du cœcyx.
- c) Ilustrar de l'arcade pubienne
- d) Urethre membraneux qui s'engage dans la

valve.

e) Bulbe de l'urètre.

f) Anne

g) Prostata.

h) Coupe de la peau.

i) Col de la vessie

m) Vessie

n) Scrotum.

o) Limite entre la partie spongieuse et bulbueuse de l'urètre

p) Limite de la fosse naviculaire

q) Coupe du verruca.

CONSTRUCTION DE LA FIGURE II.

Instruments pour la dilatacion de l'acier.

FIG. P. Bougie métallique.

a) tige cylindrique d'acier ou de métal anglais.

b) plaque de la bougie.

c) portion flexible de la bougie conique, métalliquement formée d'une tige de cuivre conique, terminée d'un tigeau de plomb, pour la grosse, accolée à son extrémité — l'instrument est tout dard.

FIG. IP. Dilatateur à chapelot.

a) canal.

b, c) tige de cuivre conique à son extrémité a qui traverse tout l'instrument.

d) vis à pression pour flair le fil de cuivre, l'autre extrémité étant soudée avec la première griffe e.

e) bouton de la vis interne, pour mettre en tension flexible le fil de cuivre.

f) portion conique formée d'un certain nombre de griffes métalliques gradués en pyramide.

FIG. 3. Dilatateur à arcet.

a) canal.

b, c) fig. 3 bis, portion flexible et accolée de l'instrument.

c) fil d'argent qui se cache dans la rainure et parcourt l'instrument dans toute sa longueur.

d) dans cette extrémité le fil est fixé à vis

e) bouton de la vis interne pour servir en tournant à tirer le fil et faire secher

Instruments pour la taille périale

FIG. 4. Tenettes droites à branches croisées et décroisées pour les anévrysmes. Les branches sont articulées en a, a

b les articulations à charnière fixées aux branches

FIG. 5. Cathéter

a) cathéter cannelé et monté sur un manche.

b) le manche

c, d) dard cannelé caché dans la rainure du cathéter

e) bouton pour déglaiser le point d'arrêt de la tige qui parcourt tout l'instrument.

f) bouton terminal de cette tige. En tirant le bouton et aussi la tige, le dard est poussé horizontalement hors de la cannelure du cathéter, et il s'arrête, attendu que dans le manche la tige rencontre un point d'arrêt.

FIG. 6. Bistouri droit, long et biseauté, légèrement courbé vers le bouton qui est très petit et dur.

Instruments pour opérer les fistules vagues

DESCRIPTION DE LA PLANCHE III

FIG. 1. Speculum.

a) le manche contenant une échelle métallique croisée.

b, b') deux vis ou bras terminaux de l'échelle.

c) vis à pression.

d) crémaillère à double denton pour faire l'articulation de l'arc ovale.

e, e') arc ovale articulé en f, f' avec les extrémités à T du manche.

f, f') cette articulation qui donne à l'arc un mouvement de bascule.

g) gouttière montée sur une bécaille, qui est l'autre extrémité de l'échelle située dans le manche.

h, h') l'arc ovale e, e' est dans un grand angle dissimulé et ses extrémités représentent deux petites gouttières, qui se forment un angle droit pouvant appuyer sur l'arcade du pubis.

Fig. 3. Gouttière plus grande que l' on peut changer et monter sur le même manche fig. 1. On peut démonter l'arc *a, a* et il reste alors la simple gouttière fixée sur le manche, ce qui sera utile dans les cas de fistules superficielles.

a) boutonnières qui dans le passage au bouton applati du manche.

b, c) courbe dorsale de la gouttière s'adaptant à la courbe qui forme le prolongement de la face interne du scrotum.

Fig. 4. Suspenseur testiculaire-épididymaire à crochet double.

a, a) deux stylets, l'un fixé sur la tige de l'instrument et l'autre sur la capsule b.

b) capsule se confondant avec la moitié supérieure du gland qui surmonte le manche.

c) l'autre moitié du gland est munie d'un petit bouton *e* à ressort qui fixe les deux moitiés du gland, à quelque cent le point où elles se trouvent réunies. Les deux stylets, se sont parallèles, se vont plus ou moins divergents.

DESCRIPTION DE LA PLANCHE IV.

FIG. 1. Presse double à cassette

a, a) deux tiges sensitives et parallèles, couchées sur le plat.

b) anneau qui rapproche ou éloigne les deux branches a a, selon qu'on le presse en avant ou en arrière.

c) compresseur articulé dans la direction transversale et monté sur un levier.

d) levier double s'articulant avec l'instrument en deux points.

FIG. 2. Presse à anneau en peu courbe sur le plat et à point d'arrêt.

a, c) levier double s'articulant en 3 avec le compresseur d.

d) le compresseur forme une pince dans toutes les directions avec la fourchette qui est montée sur la presse à anneau.

FIG. 3. Presse égrappe à ressort

a) crémillère à double bouton pour fixer l'ouverture de la pince.

Description de la Plaque V.

Fig. 1. Hameçon à double courbe sur le plat (droit et gauche).

Fig. 2. Suspenseur venoso-vaginal à crochet articulé.

a) parties articulaires formant le crochet.

b) leviers à vis pour faire articuler la portion a.

Fig. 3. Aiguilles tubulaires de l'épave divergées, se mouvant sur le mince pousse-til.

Fig. 4. Franchettes verticales de grandeur et de forme

Fig. 5. Porte-aiguille et pousse-til

a) canal se fermant sur sa tige centrale par $\frac{1}{2}$ de cercle, après les points d'arrêt en b. Le tron terminal de la canule présente une échancrure qui donne passage à la dent de l'aiguille, et quand la canule est tournée à gauche, l'aiguille reste fixe.

b) échançurée sur la roulette pour faciliter le mouvement de la canule

c) petite cage où sont cachées deux roulette, dont l'une est sur un pivot qui traverse deux sections de la cage, et l'autre est soutenue par une tige à ressort

d) dans le manche, se dévissant, est cachée une bobine de fil d'argent, qui traverse l'instrument entier, et il est poussé en avant ou en arrière par les roulettes.

DESCRIPTION DE LA PLANCHE VI.

FIG. 1. Ajusteur et tord-til.

a) tige à chaîne rotative terminée par deux petits tecs.

b) caule légèrement courbe qui rend la tige rotative.

c) caule se continuant avec la précédente plus grosse, parce qu'elle renferme une hélice, qui est mise en mouvement en poussant en avant ou en arrière les deux anneaux d. L'hélice se continue avec la tige à chaîne rotative.

Instruments pour la profilure de la tête visco-élastique.

FIG. 2. Bouteau fait en or pur.

a) Bouteau visuel traversé par un fil métallique.

b, c) petits tubes vissés au bouteau.

d) Bouteau visuel creux avec deux petits trous pour donner le passage aux bouts du fil.

FIG. 3. Le Bouteau monté.

Fig. 4. Bouton simple.

Fig. 5. Bouton double en caoutchouc

a) relevé.

c, c') deux bords, l'une ventrale, l'autre v-
ginale

Fig. 6. Pince avec mouvement par glissement.

a, c) extrémités des deux branches à fer de
cheval.

b) extrémité de la branche mobile de la pince

c) extrémité de l'autre branche fixée au mas-
cle

d) bouton de la vis.

DESCRIPTION DE LA PLANCHE VII

L'opération représentée par figures

FIG. 1. Le speculum est appliqué; on voit le champ de l'opération; le compresseur mince-vaginal à crochet double est à sa place et il a couvert le trou distal par une boussole; les deux fourchettes sont placées.

FIG. 2. La double pince à queue embrassée et enfermée en soi avec le compresseur les deux fourchettes et la couche de muscane qui doit être enlevée pour l'avortement.

FIG. 3. On voit le trou séculaire et tout à l'entour le paroi vaginale érodée.

FIG. 4. Les fils sont tous passés.


FIG. 5. La suture est soignée.


TABLE DES MATIÈRES

Les Éditeurs	pag.	5
Dédicace	»	7
Rapport à l'Académie impériale de Médecine sur le prix d'Argenteuil (période de 1862-1869)	»	11
du même	»	21
de même	»	22
Considérations sur l'anatomie topographique de l'urètre, de la vessie et des organes réjū- nens	»	43
Sur les rétrécissemens de l'urètre. — Définition	»	53
Réflexions cliniques sur les rétrécissemens de l'urètre	»	74
Résultats des recherches d'anatomie pathologique	»	85
Traitement des rétrécissemens	»	85
De la méthode par dilatation et des instrumens de l'auteur	»	99
Appendice sur un nouveau procédé opératoire pour la taille chez l'homme	»	129
Sur l'extirpation de la pierre de la vessie et pro- position de nouveaux thermiques. Communi- cation faite à l'Académie impériale de Médecine, le 10 juillet 1879	»	135
Sur les tumeurs vaginales — Coup d'œil sur la méthode de les opérer et classification	»	147

Pertube vésico-vaginale	pag.	155
Pertube vésico-utéro-vaginale	+	168
Pertube utéro-vésico-vaginale	+	171
Excursion totale du vagin avec large ouverture de la paroi vésicale	+	175
Préface des Études vésico-vaginales	+	177
Appendice. — Procédé opératoire vagino-cystique pour la toule	+	183
Explication des planches	+	185

CC5 607 015





© 1880 Wm. H. W.

Wm. H. W.





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 3





Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



图 VI



1880年

1880年



Fig. 1



Fig. 5





LA MIGLIARE

LA MIGLIARE

LA MIGLIARE

di Enrico SERRAVALLO

SOMMARIO

1. La Migliaia	1
2. La Migliaia	2
3. La Migliaia	3
4. La Migliaia	4
5. La Migliaia	5
6. La Migliaia	6
7. La Migliaia	7
8. La Migliaia	8
9. La Migliaia	9
10. La Migliaia	10
11. La Migliaia	11
12. La Migliaia	12
13. La Migliaia	13
14. La Migliaia	14
15. La Migliaia	15
16. La Migliaia	16
17. La Migliaia	17
18. La Migliaia	18
19. La Migliaia	19
20. La Migliaia	20
21. La Migliaia	21
22. La Migliaia	22
23. La Migliaia	23
24. La Migliaia	24
25. La Migliaia	25
26. La Migliaia	26
27. La Migliaia	27
28. La Migliaia	28
29. La Migliaia	29
30. La Migliaia	30
31. La Migliaia	31
32. La Migliaia	32
33. La Migliaia	33
34. La Migliaia	34
35. La Migliaia	35
36. La Migliaia	36
37. La Migliaia	37
38. La Migliaia	38
39. La Migliaia	39
40. La Migliaia	40
41. La Migliaia	41
42. La Migliaia	42
43. La Migliaia	43
44. La Migliaia	44
45. La Migliaia	45
46. La Migliaia	46
47. La Migliaia	47
48. La Migliaia	48
49. La Migliaia	49
50. La Migliaia	50

MANUALE

DI CHIMICA ELEMENTARE

DI CHIMICA

di GIUSEPPE BRISI

di G. Brisi